

# NOTULAS FAUNISTICAS

ISSN-0327-0017

- 1993-

Nº 46

ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE *Pipraeidea melanonota melanonota* (VIEILLOT, 1819) EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y EN EL NORTE ARGENTINO (AVES, EMBERIZIDAE: THRAUPINAE)

Julio Rafael CONTRERAS (1) y Andrés Oscar CONTRERAS (2)

ON THE DISTRIBUTION OF *Pipraeidea melanonota melanonota* (VIEILLOT, 1819) IN THE REPUBLIC OF PARAGUAY AND IN NORTHWESTERN ARGENTINA (AVES, EMBERIZIDAE: THRAUPINAE)

*Some new and interesting records of the Fawn Breasted Tanager, P. m. melanonota, from Eastern Paraguay and from the North of the Province of Corrientes, Argentina, are given. These records and the extant knowledge of the species from Museum specimens and from the ornithological literature contributes to perform a new interpretation of the annual behavior of the species: all the evidences suggest that P. m. melanonota is a resident and reproduces in the Eastern Paraná and galley forests of Brazil, Paraguay and Uruguay, and in the cold season some specimens flew to the west reaching the NW of Corrientes, the Ñeembucú of Paraguay, some localities in the uppercourse of the Paraguay River and the coast of the Province of Buenos Aires.*

La distribución de esta especie, cuya geonemia está bastante aproximadamente expresada en la obra de RIDGELY y TUDOR (1989: 285), ha sido objeto de nuevos aportes que amplían en la Región Oriental del Paraguay y en la Provincia de Corrientes, Argentina, los límites reconocidos para la misma.

En el Paraguay Oriental era conocida para Puerto Bertoni, Alto Paraná (BERTONI, 1914: 62); para Sapucaí, Paraguairí (CHUBB, 1910: 624); para Colonia Cambyretá, Itapúa (LAUBMANN, 1940, 2: 157); para Capitán Meza, Itapúa (CHAVES y CHEBEZ, 1988: 5); para Choré, San Pedro (HAYES y ARECO DE MEDINA, 1988: 64); y para Golondrina I, Caazapá (25° 33' S - 55° 30' W); Ea. San Antonio, Caaguazú (25° 18' S - 55° 20' W); Itabó, Canindeyú (24° 27' S - 54° 38' W), Reserva Mbaracayú, Canindeyú; Lagunita, Canindeyú (24° 07' S - 55° 26' W); y Jejuí-mi, Canindeyú (24° 07' W - 55° 32' W) (BROOKS, 1992). Otra referencia bibliográfica corresponde a HELLMAYR, (1936: 79), quien menciona un ejemplar procedente de "Carayeni", localidad no ubicable (PAYNTER y CAPERTON, 1977), y posiblemente equivocada en su grafía.

Los datos inéditos y novedosos procedentes del Paraguay son los siguientes: un ejemplar visto en el Museo Nacional del Paraguay, cazado en Capitán Miranda, Itapúa el 29.IX.1982; numerosas localidades en los departamentos Alto Paraná y Canindeyú donde la especie fue observada, especialmente las áreas de reserva de Itabó, Itakyry y Tatí Jupí, y dos ejemplares colectados

(1) PROBBAS, CONICET, Casilla de Correo 26, 3400 Corrientes, ARGENTINA

(2) Instituto Tecnológico, Universidad de Pilar, Melo e Iturbe, Pilar, Ñeembucú, PARAGUAY

NOTULAS FAUNISTICAS	Nº 46	1993	Pp. 1-4	CORRIENTES, ARGENTINA
---------------------	-------	------	---------	-----------------------

existentes en el Museo de Itaipú, procedentes de Itaimbey, Bortolani, Alto Paraná, 23. VI. 1988, y de Itabó, Itaipú, Alto Paraná, 22. VIII. 1988 (N. PEREZ VILLAMAYOR y A. COLMAN JARA, com.pers.). En la Reserva de Mabaracayú la especie fue vista en febrero de 1988 por J. R. CONTRERAS, y en agosto de 1993 por Alberto MADROÑO (com. pers.). Los autores observaron un ejemplar en la Estancia San Antonio, al norte de Tacuaras, Ñeembucú, el 12. IX. 1993; y A. O. CONTRERAS colectó un ejemplar en la Estancia Pasó Pucú, Curupayty, Ñeembucú, el 5. VIII. 1993, el que fue depositado en la Colección Ornitológica de la Estación Biológica del Ñeembucú, Pilar.

De la Provincia argentina de Corrientes, se examinaron en el Museo Argentino de Ciencias Naturales B. Rivadavia, de Buenos Aires, cuatro ejemplares de la Colección Partridge, procedentes uno de Colonia Garabí, Santo Tomé, otro de Torrent, Alvear, y dos de Garruchos, Santo Tomé. Adicionalmente, existen registros visuales realizados por J. R. CONTRERAS en enero de 1978 en Paso Maracayá, Rincón de Santa María, Ituzaingó; en Mbarigüí, Berón de Astrada, en junio de 1993 por J. L. BALDO (com. pers.), y en la Estancia Santa Teresa, Mburucuyá, el 30. VII. 1993 por Judith HUTTON (com. pers.).

Esta especie, encontrada tan al norte como en Chapada, Mato Grosso, Brasil ( $14^{\circ} 11' S - 59^{\circ} 58' W$ ), y tan al sur como ambos extremos de la Bahía de Samborombón, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina: al norte en la Estancia Juan Jerónimo, el 26. X. 1942 (PEREYRA, 1942: 225) y al sur (NAROSKY y DIGIACOMO, 1993: 99), se extiende por los estados brasileros de Mato Grosso do Sul, el este de Minas Geraes, el Sur de Bahía, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul (NORGAARD - OLSEN, 1973: 83). Alcanza también Uruguay. Penetra hacia el este en el sur del Paraguay Oriental, y en las provincias argentinas de Misiones y Corrientes. Desde estas últimas describe un arco con concavidad orientada hacia el occidente, volviendo a aparecer en la Argentina en el noreste de de la Provincia de Buenos Aires. No fue encontrada ni en el este del Uruguay (GORE y GEPP, 1978) ni en la Provincia argentina de Entre Ríos (CONTRERAS, 1993).



Figura 1. Distribución de *Pipraeidea melanonota melanonota*. El área punteada es la de residencia. Los círculos negros corresponde a registros documentados. Las líneas indican registros en la estación fría.

No existen elementos de juicio suficientes como para establecer si las nuevas localidades del sudoeste paraguayo y del norte correntino pudieran ser el fruto de la expansión reciente de la especie. La suposición de RIDGELY y TUDOR (1989: 286) acerca de su expansión en áreas deforestadas no cuenta con aval para la subespecie *melanonota*, que tiene registros predominantemente selváticos en la provincia argentina de Misiones y en el Paraguay, y que no parece haber experimentado desplazamientos manifiestos en el área estudiada. Por otra parte, hay datos occidentales de vieja data. SICK (1984: 689) la considera selvática y "de restingas".

Los datos disponibles indican una presencia predominantemente invernal o de primavera temprana tanto en el este correntino como en el Ñeembucú paraguayo. Igual en la Provincia de Buenos Aires (NAROSKY y DIGIACOMO, 1993: 99). La interpretación más posible es que la especie abandonaría regular u ocasionalmente las áreas selváticas desplazándose hacia zonas boscosas del oeste durante el período frío del año. Este no es un modelo muy común de comportamiento anual de una especie con vinculación biogeográfica paranense, pero las evidencias hasta ahora examinadas lo avalan. Los registros uruguayos más occidentales también son de invierno (CUELLO y GERZENSTEIN, 1962). Posiblemente los ejemplares de Chapada y de Corumbá (HELLMAYR, 1936: 67) también sean de la estación fría. Falta establecer la posible nidificación de la especie en áreas occidentales, hasta ahora no descubierta.

#### AGRADECIMIENTOS

A Yolanda E. DAVIES por su participación en el trabajo de campo; a Jorge R. NAVAS y a Nancy LOPES de KOCHALCA por habernos permitido revisar las Colecciones a su cargo; a Nelson A. PEREZ VILLAMAYOR, Andrés COLMAN JARA, Judith HUTTON, Jorge Luis BALDO y Alberto MADROÑO por la gentil comunicación de sus datos observacionales.

#### BIBLIOGRAFIA

- ALLEN, J. A. 1891. On a Collection of Birds from Chapada, Matto Grosso, Brazil, made by Mr. Herbert M. SMITH. Part I. Oscines. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 3: 337 - 380.
- BERTONI, A. de W. 1914. *Fauna Paraguaya. Catálogos sistemáticos de los Vertebrados del Paraguay*. Talleres Gráficos M. Brossa, Asunción, pp. 1 - 86.
- BROOKS, T. (Ed.). 1992. *Project Canopy '92. Preliminary Report October 1992*. Emmanuel College, Cambridge, England, pp. 1 - 59.
- CHAVES, H. A. y J. C. CHEBEZ. 1988. Aves de Capitán Meza, Paraguay, depositadas en el Musco Regional "Anibal Cambas" de Posadas, Misiones. *APRONA Bol. Cient.*, (5): 3 - 5.
- CHUBB, C. 1910. On the Birds of Paraguay. *Ibis*, (9) 4 (4): 571 - 647.
- CONTRERAS, J. R. 1993. Lista preliminar comentada de la avifauna de la Provincia de Entre Ríos, República Argentina. *Hist. Nat.*, 8 (5), en prensa.
- CUELLO, J. y E. GERZENSTEIN. 1962. Las aves del Uruguay. Lista sistemática, distribución y notas. *Com. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo*, 6 (93): 1 - 240

- NAROSKY, S. y A. G. DIGIACOMO. 1993. **Las Aves de la Provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus**. AOP - Vázquez Mazzini - L.O.L.A., Buenos Aires, pp. 1 - 128.
- NØRGAARD-OLSEN, S. 1973. **Tanagers. Volume 1**. Skibby - Books, Skibby, Denmark, pp. 1 - 255.
- PAYNTER, R. A. y A. M. G. CAPERTON. 1977. **Ornithological Gazetteer of Paraguay**. Mus. Comp. Zool., Harvard College, Cambridge, Mass., pp. 1 - 43.
- PEREYRA, J. A. 1942. Avifauna Argentina (Contribuciones a la Ornitología). **Mem. Jard. Zool. La Plata, 10**: 171 - 274.
- RIDGELY, R. S. & G. TUDOR. 1989. **The Birds of South America. Volume 1. The Oscine Passerines**. Univ. Texas Press, Austin, pp. i - xvi + 1 - 516.
- SICK, H. 1984. **Ornitologia Brasileira, Uma Introdução. Volume 2**. Editora Universidade de Brasília, Brasília, pp. i - viii + 483 - 828.

#### NOTULAS FAUNISTICAS

Boletín de Ciencias Naturales de aparición no periódica  
Editor Responsable: Julio Rafael CONTRERAS  
Casilla de Correo 26,3400 Corrientes, ARGENTINA.