SUPLEMENTO AL GATALOGO

ORDEN

RHEIFORMES

(Rev. Soc. Cient. Parag. T. V, N. 5, p. 4, 1941)

RHEA AMERICANA NOBILIS BRODD

Strutio americanus Linnaeus, Syst. Nat. ed. X. I. pag. 155, 1758. T. t. Brasil, Sergipe. Rhea americana nobilis, subsp. nov. Pierce Brodkorb, Proc. Biol. Soc. Wash. v. 52, pp. 83-84, Junes 5, 1939. T. t.: Paraguay 40 Kl. West. Southwest of, Capitán Bado, Nov. 16, 1938. Holotipo macho adult. Leg. A. Schulze, Univ. Mich. Mus. Zool. núm. 100, 001.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay, east of the Río Paraguay; Capitán Bado, Horqueta, Rosario. (Brodkorb).

ORDEN

FALCONIFORMES

(Rev. Soc. Cient. Parag. T. VI, núm. 3, p. 33 1944)

MILVAGO CHIMANGO AZARAE BRODK

Polyborus chimango Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., 5, p. 260, 1816. T. t. Paraguay ex Azara núm. 5. Milvago chimango azarae, subsp. nov. Pierce Brodkorb, Proc. Biol. Soc. Wash., v. 52, pp. 83-84, June 5, 1939. T. t. Paraguay. 25, Klms. east of, Rosario, June 2, 1937. Holotipo macho adult. Leg. A. Chulze, U. M. M. T., núm. 93198.

NECROLOGICAS

Farmacéutico Don Pedro M. Rodríguez

Ha fallecido en esta Ciudad el día 3 de Agosto de 1945, el distinguido hombre de Ciencias que en vida fuera el señor Pedro M. Rodríguez.

Tesorero Perpétuo desde 1921 de la Sociedad Científica del Paraguay, desempeñó desde su fundación el cargo con acierto y fino sentido de Administrador de fondos hasta su muerte.

Graduado de Farmacéutico, prestó relevantes servicios a la Cruz Roja Paraguaya ocupando la Jefatura de Farmacia desde 1928 a 1936—de modo que desempeñó sus funciones durante los azarosos tiempos de la pre-guerra y de la Guerra del Chaco con celo encomiable y hondo sentido patriótico.

Era Vice Presidente de la Academia de Cultura Guaraní y miembro correspondiente de varias asociaciones de Química y Farmacia del extranjero.

La desaparición del estimable consocio deja un vacío difícil de llenar en el seno de colegas y amigos sin cuento.

Paz en la tumba del querido consocio.

LA REDACCIÓN

Asunción, Octubre de 1945.

CATALOGO SISTEMATICO DE LAS AVES DEL PARAGUAY

POR EL DR. B. PODTIAGUIN

Tomo — I Folleto — 2 — 2ª. parte

Los Ordenes: Galliformes, Gruiformes,

CATALOGO

(Continuación Rev. Soc. Cient. Parag. t. VI, 3, 1944 p. T.)

ORDEN

GALLIFORMES

SUBORDEN

GALLI

Superfamilia — CRACOIDEA

Familia — CRACIDAE

GENERO

CRAX LINN., 1758

(Crax Linnæus, Syst. Nat. ed. X, 1, p. 157. Genotipo: Crax rubra Linn., dest. por Ridgway, Man. N. Am. Birds, ed. 2, p. 207, 1891).

129 — CRAX FASCIOLATA SCLATERI, G. R. GRAY

Muihtú (P) Mutúm (B)

Crax fasciolata Spix, Av. Bras., II, p. 48, pl. 62.2, 1825. T. t: Brasil — Pará Crax Sclateri G. R. Gray, List. Brids, Brtl. Mus., Gallinæ, p. 14. 1867.

Crax Sulcirostris Ihering. Rev. Mus. Paul., 3, p. 409, 1898.

Crax Sclateri G. R. Gray. Berlepsch, Jour. f. Ornith. 35 p. 34, 1887. Kerr. Ibis, p. 147, 1892. Bertoni, An. Cient. Parag., p. 189, ex Azara N. 338, 1901. Bertoni, Faun. Parag., Av. p. 35, 1914. Bertoni, Rev. Soc. Cient. Parag., II, 6, p. 257, 1930.

Crax fasciolata Sclateri G. R. Gray, Azara, «Mitú», N. 338, Apunt. etc. 1805. J. L. Peters, Check List of Birds Word. t. II, p. 11. 1934. Krieg und Schuchmacher, Verh. Ornith. Ges. Bay. 21, p. 15 1936. Laubmann, Vög. Parag. I. p. 122, 1939. Bertoni, Cat. Sist. Aves. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, p. 17, N. 15, 1939.

Crax fasciolata fasciolata. Jhering, Rev. Mus. Paul., VI, p. 342, 1904.

Crax S. Sclateri G. R. Gray. Namburg. Bull. Am. M. N. I. LX. p. 69, 1930. List. Sist. Av. Arg. «Hornero» VI, 1, p. 134, 1935.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Alto Paraná; Chaco: Río Pilcomayo, Río Confuso, Estancia Suhin, Fortín Orihuela (Leg. J. Caballero), Pto. Casado, Pto. Sastre, Pto. Barbero, Colonia S. Lázaro, Zanja Moroti, Pedro Juan Caballero, Ygatimi; Argentina: Chaco entre Pilcomayo y Bermejo, raramente más al Sud (List. Sist. Av. Arg. 228, 1935). Misiones. Brasil, San Paulo, S. E. Bolivia.

GENERO

ORTALIS MERR. 1786

(Merrem, Avium Rar. Icon. et. Des. f. 2, p. 40, 1786. (Gerbino: Phasianus motmot Linn).

130 — ORTALIS CANICOLLIS CANICOLLIS (Wagl)

Yakú Karaguatá, Yakú - i, Charata (P); Charata (A); Aracua (B). Penelope canicollis Wagler, Isis, p. 1112, 1830. T. t: Paraguay ex-Azara N. 336.

Ortalis canicollis grisea Cherri et Reichenberger. Am. Mus. Nov. N. 27, p. 2, 1921.

Ortalida canicollis canicollis (Wagl.), Bertoni. Cat. Sist. Vert. Av. p. 17, N. 18, Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, 1939.

Ortalis canicollis canicollis (Wagl), Azara. Yacú Caraguatá, N. 336. Apunt. etc. 1805. Berlepsch, Jour. f. Ornith. 35, p. 126, 1887 Kerr. Ibis, p. 148, 1892. Kerr. Ibis, p. 234 1901. Bertoni, Anl. Cient. Parag. p. 189, 1901. Ihering. Rev. Mus. Paul. VI, p. 342, 1904. Grant. Ibis, p. 461, 1911. Bertoni, Faun. Parag. p. 35, 1914. Cherrie and Reichenberger, Am. Mus. Nov. 27, p. 2, 1921. Wetmore, Bull. 133, U. S. N. Mus. Wash. p. 116, 1926. Laubmann, Wiss. Erg. Deut. Gr. Chaco Exp. Vogel. p. 84, 1930. Naumburg. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. vol. LP. IX. p. 86, 1930. J. L. Peters. Check-List Birds. Wor. p. 215, 1934. List. Sist. Av. Argent. «Hornero», VI, 1, p. 136, 1935. Krieg and Schuhmacher, Verh. Ornith. Ges. Bayern, 21, p. 12, 1936. Laubmann, Vog. Parag. I, p. 128, N. 50, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Río Pilcomayo, Río Confuso, Chaco 5, Remanecito (Pto. Juan Barbero), Pto. Pinasco, Kl. 80, Pto. Casado, Pto. Sastre, Cerro Golvan (Laubmann), Fortín Wheeler, Colonia San Lázaro, Estrella «Laubmann», Zanja Moroti «Laubmann», Concepción, Carayá, Vuelta Watkhlatingma-yalwa, Monte Alto, Pto. San Juan. — Central Paraguay region

131 — ORTALIS ARAUCUAN SQUAMATA LESSON

Aracua «B»

Penelope araucuan Spix, Av. Bras. 2, p. 56, 1825. T. t: Brasil — San Domingos, Minas Geraes. Ortalida Squamata Lesson, Dict. Sci. Nat. 6d. Levrault. 59, p. 195, 1829, T. t: Brasil, Sta. Catharina.

Ortalida guttata «Spix». ? Bertoni, N. 90, Catl. 1901. Bertoni, Cats. Sist. Vert. Prg. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, p. 17, N. 19. 1939.

FE DE ERRATAS

DITRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Río Paraguay, Río Picomayo, Río Confuso, Asunción «Bertoni» Alto Paraná, Argentina: Chaco, Misiones, Corrientes, Brasil, Río Grande do Sud, Uruguay.

131 — PENELOPE OBSCURA BRIDGESI GRAY

Pava de monte de Bolivia «A».

Penelope obscura Temminck, Hist. Nat. Pig. et Gall., III, p. 68, 1815. T. t.: Paraguay ex-Azara N. 335. Penelope bridgesi G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, p. 270, 1880.
T. t: Bolivia.

Penelope O. Bridgesi Gray. Bertoni, Cats. Siets. Verts. Aves p. 17. Rev. Soc. Científica del Paraguay, t. V, N. 4, p. 17. N. 21, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Chaco «Bertoni», Villazón, Carandayty, Estrella «Chaco», Fortín Orihuela «Chaco Leg. J. Caballero». Argentina: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. S. Bolivia.

132 — PENELOPE SUPERCILIARIS MAYOR BERT.

Yakú poi «P» Yacupeba «A»

Penelope superciliaris Temmink. Hist. Nat. Pig. et Gall. III, p. 72, 693. 1815. T. t: Brasil — Pará. Penelope purpurescens mayor Bertoni. Anal. Cient. Parag. p. 19, 1901. T. t — Paraguay, Alto Paraná, Río Mboká — ih. 25,43v.

1901. Bertoni, Ann. Cient. Parag. p. 183, 1901. Ihering. Rev. Mus. Paul. VI, p. 342, 1904. Grant. Ibis, p. 461, 1911. Bertoni, Faun. Parag. p. 35, 1914. Cherrie and Reichenberger, Am. Mus. Nov. 27, p. 2, 1921. Wetmore, Bull. 133, U. S. N. Mus. Wash. p. 116, 1926. Laubmann, Wiss. Erg. Deutsch. Gr. Chaco Exp., Vogil. p. 84, 1930. Naumburg, Bull. Am. Mus. Nat. Hist. val. IP. IX. p. 86, 1930. J. L. Peters. Check-List Birds Wor., p. 21, 1934. List. Sist. Av. Argent. «Hornero», VI, 1, p. 196, 1935. Krieg und Schuhmacher, Verh. Ornith. Ges. Bayern. 21, p. 12, 1936. Laubmann, Vog. Parag. I, p. 128, N. 50, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Río Pilcomayo, Río Confuso, Chaco-I, Remancito (Pto. Juan Barbero), Pto. Pinasco, Kl. 80, Pto. Casado, Pto. Sastre, Cerro Golvah (Laubmann), Fortin Wheeler, Colonia San Lázaro, Estrella «Laubmann», Zanja Moroti «Laubmann», Concepción, Carayá, Vuelta, Walkthlatingmayalwa, Monte Alto, Pto. San Juan.

131 — ORTALIS ARAUCUAN SQUAMATA LESSON
Aracua «B»

Penelope araucuan Spix, Av. Bras. 2, p. 56, 1825. T. t: Brasil — San Domingos, Minas Geraes. Ortalida Squamata Lesson, Dict. Sci. Nat. éd. Levrault. 59, p. 195, 1829. T. t.: Brasil, Sta. Catharina.
Ortalida guttata «Spix». ? Bertoni, N. 90, Cat. 1901. Bertoni, Cats. Sist. Vert. Prg. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, p. 17, N. 19. 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Alto Paraná: Boca del Río Piratiy, Curuguaty, Igatimi.

GENERO

PENELOPE MERREM. 1786

«Penelope Merrem, Av. rar. Icon. etc. descr. f. 2, p. 39, 1786. Genotipo: Penelope marail Gmelin = Phasianus marail P. L. S. Müller».

132 — PENELOPE OBSCURA OBSCURA TEMM.

Yakú-hu «P». Pava de monte del Paraguay «A» Jacú - guassú «B» Penelope obscura Temminck, Hist. Nat. Pig. et Gall., III, p. 68. 1815. T. t.: Paraguay: Ex-Azara N. 335.

Penelope Obscura Obscura Temm. Azara, «Jacu-hu» N. 335. Apunt. 1805. Berlepsch. Journ. f. Ornith. 35. p. 125, 1887. Kerr. Ibis, p. 147, 1892. Bertoni, Anal. Cient. Parag. p. 189, 1901. Ihering. Rev. Mus. Paul., VI, p. 342, 1904. Bertoni, Faun. Parag. p. 35, 1914. Hellmayr. Nov. Zool. XXI, p. 177, 1914. Bertoni, Rev. Soc. Cient. Parag. II, 6, p. 257, 1930. J. L. Peters, Check List Birds Wor., V. II, p. 1934. List. Sist. Av. Arg. «Homero», VI, p. 195, 1935. Krieg und Schuhmacher, Verh. Ornith. Ges. Bayern, 21, p. 13, 1936. Oliv. Pinto, Av. Bras., I, p. 97, 1938. Laubmann, Vog. Parag. I, p. 123, 1939.

DITRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Río Paraguay, Río Picomayo, Río Confuso, Asunción «Bertoni» Alto Paraná, Argentina: Chaco, Misiones, Corrientes, Brasil, Río Grande do Sud, Uruguay.

131 — PENELOPE OBSCURA BRIDGESI GRAY
Pava de monte de Bolivia «A».

Penelope obscura Temminck, Hist. Nat. Pig. et Gall., III, p. 68, 1815. T. t.: Paraguay ex-Azara N. 335. Penelope bridgesi G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, p. 270, 1880.
T. t: Bolivia.
Penelope O. Bridgesi Gray. Bertoni, Cats. Sists. Verts. Aves p. 17. Rev. Soc. Científica del Paraguay, t. V. N. 4, p. 17. N. 21. 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Chaco «Bertoni» Villagón, Carandayty, Estrella «Chaco» Fortin Orihuela «Chaco Leg. J. Caballero». Argentina: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. S. Bolivia.

132 — PENELOPE SUPERCILIARIS MAYOR BERT.
Yakú poí «P» Yacupeba «A»

Penelope superciliaris Temmink, Hist. Nat. Pig. et Gall, III, p. 72, 693. 1815. T. t: Brasil — Pará. Penelope purpurescens mayor Bertoni, Anal. Cient. Parag. p. 19, 1901. T. t — Paraguay: Alto Paraná, Río Mboká — ih. 25,43v.

Penelope Supercilliaris III. Ihering, VI, p. 342, 1904. Hellmayr Akh. Kgl. Bay. Akad. Wiss. Math. Phys. V 6. 25, 2, p. 81, 1912. Bertoni, Faun. Parag. p. 36, 1914.

Penelope purpurescens Bert. «nec Penelope purpurescens Wagler 1830» Anal. Cieht. Parag. p. 16, 1901. Arribalzaga, Anal. Mus. Nac. Bs. Ars. VII, p. 836. — Penelope Supercilliaris Illig. 1815.

Penelope purpurescens Mayor Bert. Arribalzaga, Ann. Mus. Nac. Bs. Ars. VII, d. 836, 1902 — Penelope supercilliaris.

Penelope Supercilliaris Mayor Bert. J. L. Peters, Check — List. Birds Wor. VII, p. 193. List. Sist. Av. Argent. «Hornero» VI, 1, 195, Laubmann, Vog. Parag. I, p. 123, N. 48, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Alto Paraná, Argentina: Misiones, Brasil: S. E.

NOTA: Prof. A. de W. Bertoni indica por el Paraguay Penelope Sclateri Gray = Penelope montagnii sclateri G.R. Gray «Bertoni Cats. Sit Vertbs. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, p. 17 N. 22, 1939».

GENERO

PIPILE BONAP., 1856

(Pipile Bonaparte, Compt. Rend. Acad. Sci Paris, 42, p. 187, 1856. Genotipo: Penelope leucolophos Merrem — Crax pipile Jacquin).

135 — PIPILE JACUTINGA «SPIX»

Yakú aptei «P» Yacutinga «A» Jacutinga «B».

Penelope Jacutinga Spix, II, p. 53, tab. LXX, 1825. T. t: Brasil: «Inter Bahiam et Rio de Janeiro.

Cumana Jacutinga «SPIX». Ihering, Rev. Mus. Paul. VI, 342, 1904. Bertoni, Faun. Parag. Aves, p. 35, 1914.

Pipile Jacutinga «Spix». Azara, Yakú apeti, N. 337, Apunt. etc. 1805. Berlepsch, Journ. f. Ornith. 35, p. 125, 1887. Salvadori, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, X, 208, p. 23, 1895. Bertoni, Anal. Cient. Parag. p. 219, 1894, 1901. Arribalzaga, Anal. Mus. Nac. Bs. Ars. VII, p. 23, 1934. List. Sist. J. L. Peters. Check. List Birds Wor. V. II, p. 23, 1934. List. Sist. Av. Argent. «Hornero» VI, I, p. 105, 1935. Oliv. Pinto, Av. do Brasil I, p. 103, 1938. Laubmann, Vog. parag. I, p. 127, 1939. Bertoni, Cat. Sist. Vert. Parag. Aves p. 17, N. 16, Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Alto Paraná: Caaguazú, General Caballero «Salvadori» Río Mondáih, Acara-ih y otros lugares entre los 23 y 26° de latitud «Bertoni». Argentina; Misiones, Brasil; Río Grande do Sud, Santa Catharina, Parana, San Paulo, Río de Janeiro, S. Bahia.

136 — PIPILE CUMANENSIS GRAYI «PELZ»

Pava de Gray «A»; Jacutinga «B».

«Crax Cumanensis Jacquin, Beytr. Gosh. Vog. p. 25, tab. 10, 1784. T. t: Rio Orinoco, Cumana. Penelope Grayi Pelzeln, Orn. Bras. III, p. 284, 1869 bas. sobre Penelope Jacquinini nec Reichenb. Gray, List. Birds, Mus. Gull p. 8, 1867. T. t.: Paraguay.

Cumana natterari Reich. Bertoni, Faun. Parag. p. 35, 1914.

Pipile Cumanensis, Groot. Ibis, p. 461, 1911.

Pipile Grayi «Pelz». Oliv. Pinto, Av. Bras. I, p. 103, 1938.

Pipile cumanensis grayi Pelz. Hellmayr, Nov. Zool. XV, p. 98, 1908. J. L. Peters, Check - List Birds Wor., II, p. 23, 1934. List. Sist. A. Argent., «Hornero» VI, p. 1, p. 195, 1935. Krieg und Schuhnacher, Verb. Or. Ges. Bay 2, 21, 14. 1636 Laubmann, Vog. Parag. II., p. 126, N. 49, 1939. Bertoni, Cat. Sist. Vert. Parag. Aves, Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay Central, Río Apa, Argentina; Salta, Jujuy, Chaco, Bolivia; E. Brasil; S. y O. de Matto-Grosso; Río Piquiry.

SUPERFAMILIA — PHASIANOIDEA

FAMILIA — PHASIANIDAE

SUBFAMILIA — ODONTOPHORINAE

GENERO

ODONTOPHORUS VIEILL.; 1816

«Odontophorus Vieillot, Anal. p. 51, 1816, Genotipo: «Tocro», Buffon = Tetrao gujanensis Gmelin»

137 — ODONTOPHORUS CAPUEIRA CAPUEIRA «SPIX»

Urú urú «Parag. Bertoni». Urú, capueira «A», Urú, capueira «B». Perdix capueira Spix, Av. Bras. II, p. 59, tab. 126-a, 1825. T. t: «In sylvis Rio de Janeiro et Minas Geraes proximis».

Odontophorus Dentatus. Temm. Berlepsch, Journ. f. Ornith. 35, p. 125, 1887.

Odontophorus capueira «Spix». Salvadori, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp., Torino X, p. 23, 208, 1895. Bertoni, An. Cient. Parag. p. 189, 1901, ex-Azara, N. 334, Ihering Rev. Mus. Paul., VI, p. 342, 1904. Dabbene, Anal. Mus. Nac. Bs. Ars. XXIII, p. 286, 1912. Bertoni. Fauna Parag. p. 36, 1914. List. Sist. Av. Arg. «Hornero» VI, 1, p. 196, 1935.

Odontophorus Capueira Capueira «Spix». Azara, «Uru», N. 334, Apunt. etc. 1805, Krieg und Schuhmacher, Verh. Ornith. Ges. Bayern, 21, p. 10, 1936.
Oi. Pinto, Av. Bras. I, p. 194, 1938. Bertoni, Cat. Sist. Verb. Parag. Aves. p. 17, N. 24, Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, 1939. Laubmann, Vog. Parag. I, p. 130, N. 51, 1939, J. L. Petera, Check List of Birds Wor. II, p. 53, 1934.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: S. Joachim «Salvadori», Villarrica, «Foster, Col. Mus. Nac. Hist. Parag. 485 — macho. Dabbene» Alto Parana «Bertoni» Colonia Nueva Germania «Schumacher» Argentina: Misiones. Brasil, Orient, y Merid: S. Bahia, Río de Janeiro, Minas Geraes, S. O. Matto Grosso, S. Paulo, Paraná, Santa Catharina, Río Grande do Sud, Uruguay, dept. Tacuarembó «Tremoleras».

ORDEN

GRUIFORMES

SUBORDEN

GRUES

SUPERFAMILIA — GRUOIDEA

FAMILIA — ARAMIDAE

GENERO

ARAMUS VIEILL. 1816

(Aramus Vieillot. Anal, p. 58, 1816. Genotipo: Courlili, Buffon — Ardea Scolopacea (Gml).

138—ARAMUS SCOLOPACEUS CARAU VIEILL

Karau «P». Carao «B». Carao, Viuda loca «A»

Ardea Scolopacea Gmelin, Syst. Nat. I, 2, p. 647, 1789. T. t.: Guayana Francesa Cayena. Aramus carau Vieillot. Nouv. Dict. Hist. Nat. 8, p. 3007, 1817 ex Azara N. 336. T. t: Paraguay.

Rallus Ardeoides Spix. Av. Bras. II, p. T2, pl. 91, 1825.

Aramus Scolopaceus «Gml». Berlepsch, Jour. of Ornith. 35, 1887. Kerr, Ibis, p. 149, 1892. Kerr, Ibis, p. 234, 1901. Bertoni, Anal. Cient. Parag. p. 188, 1901. Ihering, Rev. Mus. Paul. VI, p. 343, 1904. Bertoni, Fauna Parag. p. 39, 1914.

Aramus Scolopaceus Carau Vieill. Azara. «Carau». N. 336, Apunt. etc. 1805. Wetmore, Bull. 133, U. S. Nat. Mus. Wash. p. 126, 1926. Naumburg, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. IX, p. 402, 1930. List. Sist. Av. Arg. «Hornero», VI, 2, p. 343, 1936. Oliv. Pinto. Av. Bras. I, p. 106, 1938. Laubmann. Vog. Parag. I, p. 104, N. 36, 1939. Bertoni. Cat. Sist. Vert. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, p. 20, N. 94, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Pilcomayo «Berlepsch», Kerr. «Fort Nueve, Fort Page, Waikthlatinomayalwa Mondaih, Iguasú, Asunción «Bertoni», Pto. Pinasco Km 110-200 «Wetmore». Colonia Nueva Germania, Pto. Casado «Schuhmacher», Colonia Nueva Italia, «P. Willim», Río Confuso, Villa Hayes, Pto. Juan Barbero, Ypacaraí, Colonia San Lázaro «Podtiaguin», Río Paraguay: Esteros del Chaco Central, Argentina, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Tucumán, La Rioja, Brasil, Matto Grosso, S. Goyaz, Minas Geraes, S. Paulo, St. Catharina, Río Grande do Sul, Bolivia «Tarija», Uruguay.

SUPERFAMILIA RALLOIDEA

FAMILIA RALLIDAE

GENERO

ORTYGONAX HEINE 1890

«Ortygonax Heine in Heine und Reichenow. Nom. Mus. Hem. Orn. p. 321, 1890. Genotipo, Ra lus rytirhynchos Vieillot».

139 — ORTYGONAX RYTIRHYNCHOS RYTIRHYNCHOS «VIEILL»

Gallineta de pico rojo y azul «A». Saracura-Saná, Inhá-saná, saracura do Ganhado «Br.; R. Gr. do Sul. O. Pinto».

Pardirallus sanguinolentus

Rallus rytirhynchos Vieillot. Nouv. Dict. Hist. Nat., 28, p. 549, 1829. T. t: Paraguay ex Azara N. 372.

Limnopardalus Rytirhynchus «Vieill». Ihering. Rev. Mus. Paul. VI, p. 342, 1904. Chub. Ibis, p. 65, 1910. Bertoni. Faun. Parag. p. 37, 1914.

Rallus Sanguinolentus Swainson. Anim. in Menag. p. 335, 1887. T. t: Brasil.

Rallus Sanguinolentus Sanguinolentus Swain. Hellmayr. Field. Mus. Nat. Hist. publ. 308, zool. Ser. Vol. XVI, p. VI, p. 343, 1936. Laubmann. Vog. Parag. I, p. 1939. Bertoni. Cat. Sist. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, p. 18, 1939.

Ortygonax Sanguinolentus Sanguinolentus «Swain» Oliv. Pinto. Av. Bras. I, p. 109, 1938.

Rallus Rytirhynchus Vieill. Berlepsch. Jour. f. Ornith. 35, p. 125, 1887. Bertoni. Anal. Cient. Parag. p. 188, 1901.

Ortygonax Rytirhynchos Rytirhynchos «Vieill». J. L. Peters. Check — List of Birds of the World. V. H. p. 168, 1934. Azara. «Ypacahá parda» N. 372. Apunt. etc. 1805.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Sapucay «18. XI 1903 Foster» Colonia Hohenau «G. Walter» Colonia Nueva Italia «P. Willim». Paraguay «Bertoni». Argentina: Misiones, Formosa, Salta, La Rioja, Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos hasta Río Negro «List. Av. Arg. N. 240», Brasil: Río Grande. Chile: Uruguay, S. Bolivia.

140 — ORTIGONAX NIGRICANS NIGRICANS «VIEILL»

Gallineta de pico verde «A». Saracura saná «Br.»

Rallus nigricans Vieillot. Nouv. Dict. Hist. Nat. 28, p. 560, 1819. T. t.: Paraguay y Río de la Plata: ex Azara N. 371.

Limnopardus Nigricans «Vieill». Ihering. Rev. Mus. Paul. VI, 342, 1904. Chubb. Ibis, p. 65, 1910. Bertoni. Faun. Parag. p. 37, 1914.

Rallus Nigricans «Vieill». Berlepsch. Journ. f. Ornith. 35, p. 125, 1887. Bertoni. Anal. Cient. Parag., p. 188, 1901. Laubmann. Vog. Parag. I, p. 106, 1939. Bertoni. Cat. Sist. Vert. Parag. IV m N. 4, 18, N. 51, 1939.

Rallus Nigricans Nigricans «Vieill». List. Sist. Av. Arg. «Hornero», VI, 2, p. 344, 1936.

Ortygonax Nigricans Nigricans «Vieill». Azara. «Ypacahá obscura» N. 371. Apunt. etc. 1805. J. L. Peters. Check — List. Birds Wor. v. II, p. 169, 1934.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: esteros y pantanos del Río Paraguay de Puerto Casado hasta el Río Alto Paraná, Encarnación, Hohenau, Sapucay.

GENERO

PARDIRALLUS BONAP., 1856

«Pardirallus Bonaparte. Compt. Rend. Acad. Sci Paris; 43, p. 599, 1856. Genotipo — Rallus Variegatus Gmelin — Rallus maculatus Boddaert».

141 — PARDIARALLUS MACULATUS MACULATUS «BODDAERT»

Rallus maculatus Boddaert. Tabl. Pl. Ent. p. 48, 1783. T. t: Guayana Francesa Cayena, basé sobre Dabenton.

Rallus maculatus Bodd. List. Sist Av. Arg. «Hornero», Laubmann, Vog. Parag. I, p. 106, 1939.

Limnopardalus maculatus «Bodd». Bertoni, Faun. Parag. p. 37, 1914.

Pardirallus maculatus maculatus «Bodd». Azara «Jaspeado todo», N. 370, Apunt. etc. 1805. Brodkorb, Proc. Soc. Biol. Wash. 50, p. 83, 1937. Oliv. Pinto, Av. Bras. I, p. 111, 1938. Laubmann, Vog. Parag. I, p. 106, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Estancia Ytanu «Dalgleish» Horqueta «Brodkorb». Co. Nueva Italia. «Willim» Chaco-i, Pto. Juan Barbero, Alto Paraná.

GENERO

ARAMIDES PUCHERAN 1845

«Aramides Pucheran. Rev. Zool., p. 277. 1845. Genotipo, Fulica cayennensis Gmelin=Fulica cajanea P. L. S. Müller».

142 ARAMIDES YPECAHA «VIEILL»

Yhpakaá «P». Ypecaha, Huascará, Gallineta rojiza «A». Saracura-sa «B». Rallus ypecacha Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. 28, p. 568, 1819, T. t: Paraguay y Buenos Aires, ex-Azara N. 367.

Gallinula Gigas «Spix». Av. Bras. II, p. 75, pl. 99, 1825.

Aramides Ypecaha «Vieill». Azara «Ypecaha» N. 367, Apunt. etc. 1805. Berlesch, Journ. f. Ornith, 35, p. 34, 1887. Dalgleish, Proc. 148. Royal. Phys. Soc. Edin., X, p. 87, 1889. Kerr, Ibis p. 148, 1892. Salvadori, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, X, 208, p. 24, 1895. Kerr, Ibis, p. 234, 1901. Bertoni, Anal. Cient. Para., p. 188, 1901. Ihering, Rev. Mus. Paul. VI, p. 342, 1904. Bertoni, Faun. Parag. p. 37, 1914. Wetmore, Bull. 133, U. S. Nat. Mus. Wash. p. 125, 1926. Bertoni, Rev. Soc. Cient. Parag. II, 6, p. 257, 1930. List. Sist. Av. Arg. «Hornero» VI, 2, p. 344, 1936. Oliv. Pinto, Av. Bras. I, p. 113, 1938. Laubmann, Vog. Parag. I, p. 107, 1939. Bertoni, Cat. Sist. Vert. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. IV, N. 4, p. 18, N. 41, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Río Alto Paraná, Río Paraguay, Río Confuso, Paraguay Central, Asunción «Bertoni», Río Pilcomayo, Fortín Nueve «Berlepsch Kerr» Est. Ytanu «Dalgleisch», Paraguari «Salvadori», Weikthlatingma, yalwa «Kerr», Río Confuso, «Bertoni, Podtiaguin» Pto. Pinasco «Wetmore», Sapucay «Foster», Colonia Nueva Italia «Willim», Chaco-i, Pto. Juan Barbero, Río Manduvirá.

143 — ARAMIDER SARACURA (SPIX)

Gallinete mediana plomiza «A» Saracurá «B».

Gallinula saracura Spix, Av. Bras. II, p. 75, pl. 48, 1825. T. t: Brasil: Río de Janeiro.

Aramides Plumbeus Vieill. Bertoni, Faun Parag. p. 37, 1914, y Cat. Sist. Vert. Parag, t. IV, N. 4, p. 18, Rev. Soc. Cient. Parag. 1939.

Aramides Saracura «Spix». Azara, «Chiricote aplomado», N. 369, Apunt. etc. Berlepsch, Journ. f. Ornith. 35, p. 125, 1887, ex-Azara N. 369. Bertoni, Anal. Cient. Parag., p. 10. 188, 1901. Arribalzaga, Anal. Mus. Nac. Bs. Ars. VII, 334, 1902. Ihering, Rev. Mus. Paul. VI, 342, 1904. Bertoni, Faun. Parag. p. 37. 1914. List. Sist. Av. Arg. VI, 2, p. 345, 1936. Laubmann, Vog. Parag. I. p. 107, 1939. Bertoni, Cat. Sist. Vert. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, p. 18, N. 40, 1939.

DIRTRIBUCION GEOGRAFICA

Alto Paraná, Cambyretá «Bertoni, Neunteufel». En el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, figura un macho de Río Confuso.

144 — ARAMIDES CAJANEA CAJANEA (MULLER)

Sihriko «Paraguay - Bertoni» Gallineta rojiza, Chiricote «A» Saracura do brejo, Saracura, Tres Potes - Bahia, Sericoina «Brasil - Pinto».

Fulica cajanea P.L.S. Müller, Natursyst., Suppl., p. 119, 1766. T. t: Guayana Francesa - Cayena.

Rallus Chiricote Vieillot. Nouv. Dict. Hist. Nat. 28, p. 551, 1819. Ex-Azara N. 368.

Gallinula Ruficeps Spix. Av. Bras. II, p. 74, pl. 48, 1825.

Aramidess Cayennensis «Gmi». Berlpsch. Journ. f. Ornith., 34, 1887.

Aramides Chiricote «Vieill». Salvadori, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino X, p. 24, 208, 1895, Bertoni, Anal. Cient. Parag. p. 188, 1901. Chubb, Ibis, p. 65, 1910. Grant. Ibis, p. 462, 1911.

Aramides Cajanea Chiricote «Vieill». Ihering, Rev. Mus. Paul. VI, p. 342, 1904. Bertoni, Faun. Parag. p. 37, 1914. Wetmore, Bull. 133. U. S. Nat. Mus. Wash., p. 125, 1926.

Aramides Cajanea Cajanea «Mull». Helmayr, Field. Mus. Nat. Hist. publ. 255, Zool. Ser. vol. XII, N. 18, p. 431, N. 18, 1929. Ol. Pinto. Cat. Av. Bras. I, p. 122, 1938. Laubmann, Vog. Parag. I. p. 107, N. 37, 1939. Bertoni, Cat. Sist. Vert. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, p. 18, N. 39, 1939. Podtiaguin, Mat. Para est. av. Apa. Rev. Soc. Cient. Parag. t. VI, N. 3, p. 100, 1944.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Asunción, Alto Paraná «Bertoni», Río Pilcomayo «Berlepsch», Colonia Risso «Salvadori Grant», Sapucay «Chubb», Pto. Pinasco «Wetmore», Villarrica «Helmayr», Pto. Sastre «Schuhmachery Kiefer», Río Apa, Boca del Río Apa, Colonia S. Lázaro, San Louis de la Sierra, Zanja Moroti «Schuhmacher, Podtiaguin», Sma. Trinidad, Chaco-i, Villa Hayes, Pto. Juan Barbero, Colonia Nueva Italia, Ypacaraí, Río Confuso.

GENERO

PORZANA VIEILL., 1816

«Porzana Vieillot, Anal., p. 61, 1816, Genotipo: Marouette de Buffon =Rallus porzana Linn».

145 — PORZANA ALBICOLLIS ALBICOLLIS «VIEILL»

Gallineta de garganta blanca «A» Saracuru - sana de samamboia «B». Rallus albicollus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., 28, p. 561, 1819, T. t: Paraguay ex-Azara N. 374.

Porzana albicollis «Vieill» Berlepsch, Journ. f. Ornith. 35, p. 125, 1887. Bertoni, Anal. Cient. Parag., p. 188, 1901. Ihering, Rev. Mus. Paul. VI, p. 342, 1904. Bertoni, Faun. Parag. p. 37, 1934.

Porzana albicollis albicollis «Vieill». List. Sist. Av. Arg. «Hornero». VI. 2. p. 345. 1936. Oliv. Pinto. Cat. Av. Bras. I. p. 114. 1938. Laubmann, Vog. Parag. I. p. 109, N. 38. 1939. Bertoni, Cat. Sist. Vert. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV. N. 4. N. 53. 1939. Azara N. 379. Ypacaha aplomado y pardo. Apunt. etc. 1805.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Alto Paraná «Bertoni»; Río Apa, San Louis de la Sierra, San Estanislao, Argentina, Misiones, Tucumán, Buenos Aires; Brasil: San Paulo, Río de Janeiro, Minas Geraes, «Mucury, Santa Fé», S. de Goyas, «Inhuas», Bahia «Reconcavo», Pernambuco «Ol. Pinto».

146 — PORZANA FLAVIVENTER FLAVIVENTER «BODD»

Gallinitita de cejas blancas «A».

Rallus flaviventer Boddaert, Tabl. Plan. Enl. p. 52, 1756. T. t.; Guayana Francesa Cayena.

Porzana Flaviventris «Bodd». Berlepsch, Journ. f. Ornith. 35, p. 125, 1887. Bertoni, Ant. Cient. Parag., p. 188, 1901. Ihering, Rev. Mus. Paul. VI. 342, 1904. Bertoni, Faun. Parag. p. 37, 1914.

Porzana Flaviventer Flaviventer «Bodd». Azara «Ypacahá ceja blanca». N. 377. Apunt. etc. 1805. List. Sist. Av. Arg. «Hornero». VI. 2. p. 345. 1936. Oliv. Pinto. Cat. Av. Bras. I. p. 115, 115. 1938. J. L. Peters, Check. List. Birds World. v. II, p. 185. 1934.

Porzana Flaviventris Flaviventris «Bodd». Podtiaguin, Rev. Soc. Cient. Parag. t. V. N. 5. p. 66. N. 377. 1941.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Paraguay «Bertoni», Colonia Nueva Italia «Willim».

Argentina: Misiones, Tucumán, Buos. Aires; Brasil: Pará, Curitiba, Minas Geraes, Lagoa Santa, San Paulo, Iguape, S. E. de Colombia hasta S. Brasil, Guayana.

GENERO

COTURNICOPS G. R. GRAY 1854

(Cortunicos «Pr. B. 1854. «nomen nudum» G. R. Gray, Cat. gen. and Subg. Bds: p. 120. 1855. Genotipo; Rallus noveboracensis Gmelin = Fulica noveboracensis Gmelin.

147 — COTURNICOPS NOTATA NOTATA «GOULD»

Gallinita enana «A».

Zapornia notata Gould in Darwin's Zool. Vog. «Beagle», pt. 3. 132. pl. 48. 1841. T. t.; Río de la Plata.

Creciscus Notatus Vel Var.? Bertoni, Rev. Inst. Parag. p. 12. 1907.

Ortygops Notatus «Goul». Bertoni, Faun. Parag. p. 37. 1914.

Ortygops Notatus «Gould». Laubmann, Vog. Parag. I. p. 109. 1939.

Coturnicops Notatus «Gould». Bertoni, Cat. Sist. Vert. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV. N. 4. p. 18. N. 52. 1939.

Coturnicops notatus notatus «Gould». (J. L. Peters, Check-List Brds. Wor. Vol. II. p. 193. 1934. Cat. Sist. Av. Arg. «Hornero». v. VI. p. 345. 1936. Oliv. Pinto. Cat. Av. Br. I. p. 1. 118. 1937).

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Pto. Bertoni «Bertoni». Argentina: Córdoba, Bs. Aires, hasta Patagonia, Brasil: casualmente S. Paulo, Ypiranga, Pindamonhangaba «Oliv. Pinto» Uruguay.

GENERO

LATERALLUS G. R. GRAY 1855

(Laterallus «Pr. B.». G. R. Gray, Cat. Gen. Subg. Brds. p. 120. 1855. Genotipo Rallus melanophalus Vieillot).

148 — LATERALLUS MELANOPHAIUS MELANOPHAIUS «VIEILL»

Gallineta, Burrito de patas verdes «A» Frango de agua. Acana «B» Rallus melanophaius Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. 28, p. 549, 1819. T. t. Paraguay ex-Azara N. 376.

Porzana Melanophaea «Vieill». Berlepsch, Journ. f. Ornith. 35. p. 125, 1887. Berioni, Anal. Cient. Parag. p. 188. 1901.

Crecisous Melanophaeus «Vieill». Ihering, Rev. Mus. Paul. VI. 342. 1904. Bertoni, Faun. Parag. 37. 1914.

Laterallus Melanophalus «Gray». Bertoni, Cat. Sist. Vert. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV. N. 4. p. 18. N. 43. 1830.

Laterallus Melanophalus Melanophalus «Vieill». «Azara» Ipakaha pardo obscuro. Apunt. etc. N. 376. 1805. J. L. Peters, Check-List. Brds. Wor. vol. II. p. 191. 1934. List. Sist. Av. Arg. VI. 2. p. 345. 1936. Oliv. Pinto. Cat. Av. Bras. I. p. 115. 1938. Laubmann, Vogel Parag. p. 109. 1939.

both NE

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Humaitá, Pilar Paraguay «Bertoni» Argentina: Misiones, Formosa, La Rioja, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Bs. Aires, Brasil: Pará, Piauhy, Bahia, Espiritu Santo, Minas Geraes, S. Paulo, St. Catharina, Río Grande do Sul, Guayana, Uruguay.

149 — LATERALLUS LEUCOPYRRHUS «VIEILL»

Gallineta, Burrito de patas rojas «A».

Rallus leuconyrrhus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. 28, p. 550, 1819. Ex-Azara N. 375.

Porzana Leucopyrra «Vieill». Berlepsch, Journ. f. Ornith. 35. p. 35. 1887. Bertoni, Anal. Cient. Parag. p. 188. 1901.

Crecisous Leucopyrrhus «Vieill». Ihering, Rev. Mus. Paul. VI. p. 345. 1904. Bertoni, Faun. Parag. p. 37. 1914. Peters Check-List. Brds Wor. v. II. p. 192. 1934.

Laterallus Leucopyrrhus «Vieill». «Ipakahá pardo-acanelado y blanco. N. 375. Apunt. etc. 1805. J. L. Peters Check-List. Brds Wor v. II. p. 192. 1934. List. Sist. Av. Arg. «Hornero» VI. 2. 345. 1936. Oliv. Pinto. Cat. Av. Bras. I. p. 117. 1938. Laubmann. Vog. Parag. Rev. Soc. Cient. Para. t. IV. N. 4. p. 18. N. 42. 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Río Pilcomayo «Berlensch» Paraguay «Bertoni». Río Confuso. Argentina: Tucumán, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires, Uruguay, Brasil, Río Grande do Sul, S. Paulo.

150 — LATERALLUS XENOPTERUS CONOV.

Laterallus xenopterus Conover. Auk. 51. p. 365. 1934. T. t.; Paraguay.

Horqueta, 40 Klm. east of Paraguay River, Long. 57.10' W. Lat. 23.24'S
Laterallus Xenopterus Conov. Laubmann. Vogel Parag. I. p. 110, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Horqueta «Donover» Lima «Col. C. Schultz» Pedro Juan Caballero «Colección del Museo de Historia Natural del Paraguay N. 2621».

GENERO

GALLINULA BRISS. 1760

Gallinula Brisson Orn., I. p. 50. 6, p. 2, 1760. Genotipo: Gallinula Brisson=Fulica chloropus Linn.

151 — GALLINULA CHLOROPUS GALEATA «LICHT»

Yahaná, Nahaná «P» Gallineta, polla de agua grande «A» Gallinhola Frango de agua, R. G. do Sul «B».

Fulica chloropus Linnaeus, Syst. Nat. X. I. p. 152, 1758 Europa: Inglaterra. Crex galeata Lichtenstein, Verz. Sageth. und Vog. Berl. Mus. p. 36, 1818. T. t. Paraguay ex Azara N. 379.

Gallinula Galeata «Licht». Berlepsch, Journ. f. Ornith. 35, p. 125, 1887. Bertoni, Anal. Cient. Parag. p. 188, 1901. Ihering, Rev. Mus. Paul. VI, 343, 1904. Bertoni, Faun. Parag. p. 37, 1914. Bertoni, Rev. Soc. Cient. Parag. II, 6, p. 241, 1930.

Gallinula Chloropus Galeata «Licht». Azara «Iahana» N. 379. Apunt. Etc. 1805. Naumburg. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. vol. I. X. p. 74, 1930. J. L. Peters. Check List. Birds World, v. II, p. 205, 1934. List. Sist. Av. Arg. VI, 2: p. 346, 1936 Oliv. Pinto. Cat. Av. Bras. I. p. 119, 1938. Laubmann. Vog. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, p. 19, N. 46, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Monte Sociedad, Villa Hayes «Posner», Río Confuso, Colonia S. Lázaro. Argentina: Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Buenos Aires, Mendoza, Isla Trinidad. Guayabas, Brasil, Minas Geraes, Pará, Matto Grosso, San Paulo, Piauhy, Espiritu Santo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Goyas.

GENERO

PORPHYRIOPS PUCH., 1815

(Porphyriops Pucheran, Rev. Zool. p. 278, 1845. Genótipo: Fulica crassirostris J. E. Gray).

152 — PORPHYRIOPS MELANOPS MELANOPS «VIEILL»

Gallineta de escudete verde, polla de agua «A».

Rallus melanops Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., 25, p. 553, 1819. T. t. Paraguay ex Azara N. 378.

Porphyriops Melanops «Vieill». Berlepsch. Jour. f. Ornith. 35, p. 125, 1887. Kerr, Ibis, p. 149, 1892. Bertoni, Anal. Cient. Parag. p. 188, 1901. Ihering, Rev. Mus. Paul. VI, 343, 1904. Bertoni, Faun. Parag. p. 37, 1914.

Porphyriops Melanops Melanops «Vieill». Azara «Ipakahá cara negra» N. 378. Apunt. etc. 1805. J. L. Peters, Check List Birds Wor. v. II, p. 199, 1934. List. Sist. Av. Arg. VI, 2, p. 346. Ol. Pinto. Cat. Av. Brasil. I. p. 118, 1938. Laubmann. Vog. Parag. I. p. 111, 1939. Bertoni, Cat. Sist. Vert. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, p. 19, N. 55, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Río Tebicuary, Estero Patiño, Paraguay «Bertoni». Argentina: Misiones, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires. Uruguay. Brasil: Bahia Joazeiro, S. Paulo, S. Sebastiano, Río Grande do Sul. (O. Pinto). Perú.

GENERO

PORPHYRULA BLYTH, 1849

(Porphyrula Blyth 1852. Cat. Bds. Mus. As. Soc. ano 1849 p. 288. Genotipo: P. chloronotus Blyth=Porphyrio alleni Thomson).

153 — PORPHYRULA FLAVIROSTRIS (GML)

Fulica flavirostris Gmelin, Sist. N. I. 2, p. 699, 1789. T. t: Guayana Francesa, Cayena.

Porphyrio Parvus «Bodd». Kerr, Ibis, 149, 1892.

Jonornis Parva «Bodd». Bertoni, Faun. Parag. p. 37, 1914. List. Sist. Av. Arg. «Hornero», v. VI, p. 347, 1936.

Jonornis Flavirostris «Gml». Naumburg. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. v. IX, p. 74, 1930. Dabbene. Bol. Soc. Physica. I. p. 256, 1914.

Porphyrula Parva «Bodd». J. L. Peters, Check List Brds Wor. VII p. 107, 1934. Ol. Pinto, Cat. Av. Bras. I, p. 120, 1938. Bertoni. Cat. Sist. Vert. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, p. 18, 1939.

Prophyrula Flavirostris «Gml». Laubmann, Vogl. Parag. I, p. 111, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Fortín Page «Kerr». Río Pilcomayo «Bertoni Namburg». Río Apa Ki. 18. Río Confuso. Argentina: Misiones, Formosa, Brasil: Pará, Río Tapajós, Cassary, Monte Alegre etc. Goyas, Araguaya: Minas Geraes, Lagoa Santa, Matto Grosso, Corumbá, Desclavados etc. (O. Pinto). Guayabas.

154 — PORHYRULA MARTINICA (LINN)

Gallineta azulada, Polla Sultana «A» Frango d'água azul «B». Fulica martinica Linnaeus, Syst. Nat. ed. XII, 1, p. 259, T. t: Martinica.

Porphyrio Martinica «Lin». XXIII, p. 189).

Jonornis Martinica «L». Bertoni, Faun. Parag. p. 37, N. 42, 1914. List. Sist. Av. Argent. «Hornero», vol. VI, p. 346, N. 258, 1936.

Porphyrula Martinica «Linn». J. L. Peters, Check List Birds Wor. V. II, p. 206, 1934. Oliv. Pinto, Cat. Av. Bras. I, p. 120, 1937. Laubmann, Vog. Parag. I. p. 112, 1939. Bertoni, Cat. Sist. Verd. Pararag. Rev. Sociedad Cient. Parag. t. IV, N. 4, p. 18, N. 47, 1939. «Azara: Yahaná celeste y verde (N. 380), Yahaná blanco y celeste (N. 381), Yahaná blanco y pardo acanelado (N. 382), Yahana garganta celeste, (N. 383). Apunt. etc. 1805.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Alto Paraná, Pto. Bertoni «Bertoni». Villa Hayes «Posner». Río Confuso. Argentina: Misiones, Chaco, Tucumán, Buenos Aires. Brasil: todo país (O. Pinto). Desde S. Canadá, distribuida casi toda América del Sud, salvo de Chile.

GENERO

NEOCREX SCLAT Y SALV. 1869

(Neocrex, Sclater and Salvin, Proc. Zool. Soc. London, p. 457, 1868. Genotipo: Porzana erythrops Sclat.)

155. NEOCREX ERYTHROPS ERYTHROPS (Sclat.)

Gallineta pico rojo, Cocha-polla «A»

Porzana Erythrops Sclater, Proc. Zool. Soc. London, p. 343, pl. 21, 1867, T. t.: Perú-Lima.

Neocrex erythrops «Sclater». P. Brodkorb, Occ. Pap. of the Mus. of Zool. Unis. of Mich. N. 394, 1, XII, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: los Ríos: Apa, Aquidabán, Ypané, Jejui-Guazú, Puerto Casado: Kl. 170; Kl. 265: Horquata (Brodekorb, Leg. A. Schulze).

SUBFAMILIA

FULICINAE

GENERO

FULICA LINN. 1758

(Fulica Linnaeus, Syst. Nat., et X, p. 152, 1758. Genotipo: Fulica atra Linn.)

156. — FULICA ARMILLATA VIEILL.

Gallareta de escudete rojizo «A» Carpueja, Mergulhão «B»

Fulica armillata Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. 12, p. 47, 1817, T. t.: Paraguay de Azara N. 448.

Fulica Armillata Vieill. Azara «Focha de ligas roxas» N. 448 — Apunt. etc. 1805, Berlepsch, Journ. f. Ornith. 35, p. 125, 1887, ex-Azara N. 448, Ihering, Rev. Mus. Paul. VI, p. 343, 1904, Bertoni, Anal. Cient. Parag. p. 188, ex-Azara, Bertoni, Rev. Soc. Cient. Parag. II, p. 242, 1930, J. L. Peters, Check-List, Birds Wor. v. II, p. 212, 1934, List. Sist. Av. Argentina, «Hornero», VI, 2, p. 347, Laubmann, Vog. Parag. p. 112, 1939, Bertoni, Cat. Sist. Vert. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, N. 4, p. 18, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Villa Hayes «Posner», Río Confusión, R. S. Kovalenko, Chaco. Argentina, muy difundida, excepto los cordones montañosos, en las provincias norteñas, por todo el Territorio hasta Tierra del Fuego, Islas Malvinas, «List. Sist. Av. Argentina», Brasil: Río Grande do Sul, Santa Catherina, San Paulo, (Oliv. Pinto), S. Perú, Bolivia, Chile, Uruguay.

157. — FULICA LEUCOPTERA VIEILL.

Gallareta de escudete verde y amarillo «A»

Fulica leucoptera Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. 12, p. 48, 1817, T. t.: Paraguay; ex. Azara núm. 447.

Fulica Leucoptera Vieill. Azara «Focha» núm. 447, Apunt. etc. 1805, Berlepsch, Journ. f. Ornith. 35, p. 125, 1887, Bertoni, Anal. Cient. Parag. p. 188, 1901, Ihering, Rev. Mus. Paul. VI, p. 343, 1904, Bertoni, Faun. Parag. p. 37, 1914, Naumburg, Bol. Ames

Mus. Nat. Hist. Vol. LX, p. 46, 1930, J. L. Peters, Check-List, Birds, Wor. v. II, p. 213, 1934, List. Sist. Av. Argentina, «Hornero», VI, 2, p. 347, 1936, Oliv. Pinto, Cat. Av. Brasil, I, p. 121, 1937, Laubmann, Vog. Parag. I, p. 112, 1939, Bertoni, Cat. Sist. Vert. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, núm. 4, p. 18, núm. 45, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay; Argentina, como Fulica armillata Vieill, excepto las islas Malvinas (List. Sist. Av. Arg.) Brasil, Río Grande do Sul, (Oliv. Pinto), ex-Ihering, S. Perú, Bolivia, Chile, Tacna hasta el estrecho de Magallanes.

158. — FULICA RUFIFRONS PHIL. et LANDB.

Gallareta de escudete grande rojizo «A»

Fulica (err. tip.) = Fulica rufifrons Philippi et Landbeck, Ann. Univ. Chile, 19, p. 507, 1861, T. t.: Chile.

Fulica Leucopyga Gray (Nec Wagler) 23 p. 220.

Fulica Rufifrons Phil. et Landb. J. L. Peters, Check-List, Birds, Wor. v. II, p. 213, 1934, List. Sist. Av. Argentina, «Hornero», v. VI, p. 347, núm. 262, 1936.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay; Colonia Hohenau; Estero Patiño; Paraguay (Peters, List. Sist. Av. Argentina), Argentina, como Fulica leucoptera Vieill, islas Malvinas (List. Sist. Av. Arg.) Brasil, Sud, San Paulo; Iguape, Chile, Uruguay.

SUBORDEN

HELIORNITHES

FAMILIA «HELIORNITHIDAE»

GENERO

Heliornis Bonnat. 1791

(Heliornis Bonnaterre, Tab. Enc. Meth. I, pp. 1, XXXIV a 64, 1790. Genotipo: Heliornis fulicarius Bonnt. = Colymbus (fulica) Bodd.)

159. — HELIORNIS FULICA (BODD.)

Ihpenaa-i, Monka-i «P» Picapara «Ave del Sol» «A» Peca-para, «Picapara, Ipecui-Amaz; Patiño d'agua, Patinho do Igapo-Amaz; Marrequinho «B» Colymbus fulica Bodd. ex Tab. Pl. Enl. p. 54, 1783, T. t.: Guayana Francesa; Cayena.

Heliornis Fulica Bodd. Azara «Dedalera» núm. 446, Apunt. etc. 1805, Berlepsch, Journ. f. Ornith. 35, p. 125, 1887, ex-Azara núm. 446, Bertoni, Anal. Cient. Parag. 187, 1901, Ihering, Rev. Mus. Paul. V, p. 343, 1904, Vol. Naumburg, Bol. Ames. Mus. Nat. Hist. vol. LX, p. 74, 1930, J. L. Peters, Check-List, Sist. Av. Argent. «Hornero», VI, 2, p. 348, 1936, Oliv. Pinto, Cat. Av. Brasil, I, p. 112, 1937, Laubmann, Vog. Parag. I, p. 118, 1939, Bertoni, Cat. Sist. Vert. Parag. rev. Soc. Cient. Parag. t. IV, núm. 4, p. 19, 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Alto Paraná, Asunción (Bertoni). Argentina: Misiones. Brasil: Amazonas, Pará, Maranhao, Goyas, Matto-Grosso, S. Bahia, Santa Paulo, N. Honduras a Panamá, S. Méjico, Colombia, Venezuela, Guayana, Ecuador, Perú, Bolivia.

SUBORDEN

CARIAMAE

Familia Cariamidae

GENERO

CARIAMA BRISS. 1760

(Cariama Brisson, Ornith. V. 516, 1760; Genotipo: Le cariama. Palamedea cristata Linn).

160 — CARIAMA CRISTATA (LINN.)

Saria «P» Chuña de patas rojas «A» Seriema «B».

Palamedea cistata Linnaeus. Syst. Nat. XII. t. p. 232. 1766. (Cita bas. sobre Marcgrave (Cariama) «Nordeste de Brasil».

Microdactylus Marcgravi E. G. S. Hilaire 1809.

Cariama Cristata (L.) Azara «Saria» núm. 340. Apunt. etc. 1805. Berlepsch Journ. f. Ornith. 35. p. 125. 1887. «x Azara» Kerr. Ibis. p. 235. 1901. Bertoni. Arch. Cient. Parag. 188. 1901. Ihering. Rev. Mus. Paul. VI. p. 349. 1904. Bertoni. Fauna. Parag. p. 29. 1914. Wetmore. Bull. 133. U. S. Nat. Mus. Wash. p. 128. 1926. Bertoni. Rev. Soc. Cient. Parag. Ib. p. 257. 1930. Naumburg. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. vol. IX. p. 84. 1930. J. L. Peters. Check List. Sist. Av. Arg. «Homero» VI. p. 32. 1937. Oliv. Pinto. Cat. Av. Bras. t. I. p. 159. 1937. Miranda. Ribeiro. Av. Seriema. Notas. Ornithologia VII. Rev. Mus. Paul. t. XXII. p. 88. 1937. Laubmann. Vog. Parag. I. p. 113. núm. 1939. Bertoni. Cat. Sist. Vert. Parag. Rev. Soc. Cient. Parag. Bertoni. t. IV. núm. 4. p. 20. núm. 95. 1939.

Cariama Cristata Azaras Miranda-Ribeiro. Rev. Mus. Paul. XXIII. p. 88. 1937.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Pilcomayo (Waldthalangmayaw). (Kerr). Pto. Bertoni «Bertoni». Pto. Pinasco (Wetmore). Río Confuso (Bertoni). Barbero (Kerr). Wheeler (Mrs. Naumburg). San Louis de la Sierra. Apa (Schomburgk). Pto. Casado. Colonia Menonitas (Kiefer). Pto. Juan Barbero. Chaco Sec. lado «Bertoni».

Argentina: Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Chaco, La Pampa. Bolivia. Uruguay. Brasil: Central y Oriental: Matto-Grosso, Goyas, Minas Geraes, Bahia, Piauhy, Ceara, Pernambuco, S. Paulo, Río Grande do Sul. (Oliv. Pinto).

GENERO

CHUNGA HARTL. 1860

(Chunga «Burmeister». Hartlaub. Proc. Zool. Soc. Lond. p. 335. 1860. Genotipo: Dicholophus burmeisteri Hartl).

161 — CHUNGA BURMEISTERI (HARTL)

Saria bu «P» Chuña de patas negras «A».

Dicholophus burmeisteri Hartlaub. Proc. Zool. London. p. 335. 1860. T. t. Argentina. Provincias de Tucumán y Catamarca.

Chunga Burmeisteri Hartl. F. K. Inafrán. Obs. biolog. sobre la Saria bu. Rev. Soc. Cient. Parag. t. II. 5 p. 255. 1929. Bertoni. Notas sobre Chunga Burmeisteri (Hart) Rev. Soc. Cient. Parag. t. II. 5 p. 288. 1929. Brodkorb. Proc. Biol. Soc. Wash. 50. p. 33. 1937. Laubmann. Vog. Parag. I. p. 114. 1939. Bertoni. Cat. Sist. Vert. parag. Rev. Soc. Cient. Parag. t. IV. núm. 4. p. 20. 1939.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Paraguay: Pto. Casado. (Kl. 265 West of - Brodkorb). Chaco Argent. Santiago del Estero. Tucumán. Córdoba. La Rioja. Catamarca. La Pampa. (List. Sist. Av. Argentina) Jujuy. Tucumán. (Peters).

(Continuará)