




Añuma (*Anhima cornuta*) Por Silvia Centrón

El añuma, *tapakâre* o chajá real (*Anhima cornuta*) es un Anseriforme de una familia exclusiva de Sudamérica, Anhimidae, al igual que el famoso *chahâ* o chajá común (*Chauna torquata*). En el mundo existen tres especies en total dentro de esta familia, la tercera especie es el chajá chicagüire (*Chauna chavaria*), pero esta última no habita en el Paraguay, se distribuye desde el Norte de Colombia al Noroeste de Venezuela. Las dos especies que se encuentran en el Paraguay poseen una amplia distribución en Sudamérica. La más común de las dos especies que se observan en el país es el chajá común, a esta especie se la puede encontrar en casi todos los humedales de grandes extensiones del país; sin embargo, se conoce con seguridad que el chajá real habita en un solo sitio del país. Entre las tres especies dentro de esta familia, el chajá común y el chajá chicagüire son mucho más parecidos en apariencia, a diferencia del chajá real que posee un increíble “cuerno” que sobresale. El chajá real se distribuye ampliamente por Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, las Guayanas y Bolivia. En Paraguay son pocos los individuos registrados hasta hoy día y se estima que habitan unos 4 individuos en los bordes del río Paraná en el Refugio Biológico Binacional Mbaracayú y generalmente suelen los observan

los encargados del monitoreo del refugio. Su presencia varía mucho de acuerdo al estado del nivel del agua, si el área donde se los suele observar se seca, esta especie busca otro lugar para habitar.

Mapa de distribución



Fotografía: Alejandro Tabini www.birdingperu.com
 Mapa de distribución: Hugo Cabral

El chajá real es un ave acuática, habita en humedales, se caracteriza por un predominante “cuerno” frontal bastante largo, este cuerno suele romperse. Los juveniles también cuentan con un “cuerno” pero más corto que el de los adultos, y revisando algunos estudios realizados pudimos encontrar algunas variaciones de la forma del “cuerno” en el ave. Esta característica tan peculiar del ave (el “cuerno”) está formado por un cartílago. Al igual que el chajá común, posee unos espolones, que vienen a ser como unas “púas” en las alas, y éstas generalmente se encuentran escondidas.

Mide 80 cm de altura y dos metros de envergadura, posee gritos nasales y guturales. Se destaca por su alimentación herbívora. La época de reproducción se extiende durante la primavera y el verano australes, y ponen sus huevos en noviembre/diciembre en número de 2 a 7 y usualmente de 3 a 5; el tiempo de incubación es de 40 a 47 días.

Su estado de conservación a nivel global es de Preocupación Menor (LC); sin embargo, a nivel nacional se encuentra Críticamente Amenazado (CR) por la tan pequeña población que existe en el país. Aún existen pocos estudios relacionados a esta especie, por lo tanto la información a nivel nacional es muy escasa.



FIG. 2. Variation in the head plumage of the Horned Screamer in Sorso. Drawings were made on the site and are based on close range observations.

Variaciones del “cuerno” del Añuma. *The Wilson Bulletin* Vol 8 n° 2. 1986



Añuma a punto de volar. Pierre Pouliquin ©2006



Añuma en su típico hábitat de humedales. Selen Ediger, 2008



Fuente de Información:

del Hoyo, J. Elliot, A. & Sargatal, J. eds. *Handbook of the Birds of the World*. Volúmen I. Lynks Edicions. Barcelona

Guyra Paraguay. 2005. Atlas de las Aves del Paraguay

Naranjo L. G. 1986. *Aspect of the Biology of the Horned Screamer in Southwestern Colombia*. *Wilson Bull.*, 98(2), 1986, pp. 243-256

Narosky, T., & Zurieta, D. 2006. *Aves de Paraguay: Guía para la identificación de las aves de Paraguay*. – 1ra ed. – Buenos Aires: Vazquez Mazzini Editores, 240 p.