

Especie del mes

Chopi sa'yju (*Xanthopsar flavus*)

Texto: Silvia Centrón

Ilustración: César Brítez

Fotografías: Banco de Imágenes de Guyra Paraguay



El *chopî sa'yju* es una especie que sólo se encuentra en los campos naturales y agrícolas (arroz) de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es una especie clave para la conservación, debido a que se encuentra amenazada a nivel global (Vulnerable).



En tiempos históricos fue una especie común, Azara (1802) comenta que “abunda en el Paraguay y hasta Buenos Aires”, pero actualmente su población ha declinado en forma dramática debido a la pérdida de su hábitat (sobre todo de los pastizales y humedales altos, que son importantes para su nidificación), altos niveles de parasitismo de nidos de parte del *chopî hu* (*Molothrus bonariensis*), y también su captura para el comercio de aves silvestres.

Aunque la especie ha sido documentada en Paraguay desde los tiempos de Azara, fue recién en la década del 90 que se dio cuenta de la importancia del país para la especie. Su hallazgo en la zona de Yacyretá por George Ledec del Banco Mundial llevó a una serie de estudios realizados por Nancy López, de la Fundación Moisés Bertoni, Guyra Paraguay, y Rosendo Fraga y Mariano Codesido. Estos estudios documentaron que tal vez la mitad de la población global (estimada en unos 6.500 individuos) reside en el país, y que Paraguay cuenta con algunas de las colonias de nidificación y congregaciones de individuos más grandes conocidas en la actualidad. Como resultado, un total de 14 IBAs o Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, han sido identificadas en Paraguay por contar con el 1% de la población mundial de la especie. Actualmente se suele encontrar el 1% o más en estas áreas y en sitios nuevos donde se la registró por primera vez en los últimos dos años.

El *chopî sa'yju* es una especie gregaria, que anda en grandes bandadas, se posa generalmente en pastos altos inundables, en cultivos de arroz y en caminos de

tierra que pasan por pastizales. A menudo se los puede observar conjuntamente con los *chopi estero* o *guyraûro* (*Pseudoleistes guirahuro*), y muchas veces se los confunde, pero el *chopî sa'yju* es de menor tamaño y tiene la cabeza amarilla en comparación al *chopi estero* que la tiene completamente negra.

Para identificar con precisión al *chopî sa'yju* se debe tener en cuenta que tiene la cabeza, hombros, rabadilla y todo lo ventral amarillo oro y el dorso es de color negro (por ende el nombre común puesto por Azara es “Tordo cabeza amarilla”). En los machos el color es muy brillante, es muy conspicuo, en las hembras el dorso es pardo estriado, con una ceja muy definida y ventral amarillo, se asemeja mucho al plumaje de los juveniles. Se alimentan de insectos, larvas y gusanos, y funciona como un controlador de plaga en los cultivos de arroz. Las principales amenazas de la especie son, entre otros la quema de los pastizales naturales para ganadería y las extensas áreas de cambio de uso de la tierra para la agricultura.

Aunque decimos que los arrozales no provocan grandes daños en la conservación de la especie, es importante dejar espacios de pastizales naturales para que puedan reproducirse y de ese modo, mediante el desarrollo sostenible combinando producción y conservación, se ayuda a que la población de la especie aumente.

Ilustraciones para identificar con precisión al *chopî sa'yju*



Guyraûro (Pseudoleistes guirahuro)



Chopî sa'yju (Xanthopsar flavus)

