

NÓTULAS FAUNÍSTICAS

ISSN-0327-0017

- 1988 -

No. 14

DOS ESPECIES NUEVAS PARA LA PROVINCIA DEL CHACO, REPUBLICA ARGENTINA.

Claudio C. BERTONATTI¹ y Sofia HEINONEN FORTABAT¹

Durante un reciente viaje por la Provincia del Chaco se efectuaron algunas observaciones de interés relacionadas con dos especies de aves con escasos registros en la Argentina.

El 12 de octubre de 1987, a pocos kilómetros del paraje conocido como Bajada Alta (25° 21' S, 60° 54' W), se observó un ejemplar adulto de "Matico", *Icterus icterus strictifrons*. Se encontraba a la vera de un camino, en una zona de peladares caracterizada botánicamente por Quebracho blanco (*Aspidosperma quebracho-blanco*), Algarrobo negro (*Prosopis nigra*) e Itín (*Prosopis kuntzei*) como especies dominantes, acompañadas por ejemplares aislados de "Francisco Alvarez" (*Pisonia zapallo*), Tala (*Celtis tala*), Molle (*Schinus molle*), Mistol (*Ziziphus mistol*), Vinal (*Prosopis ruscifolia*) y Guayaibí (*Patagonula americana*).

El registro efectuado confirmó los datos orales recogidos de los pobladores locales, seis de los cuales reconocieron material gráfico ilustrando a la especie, a la que denominaban unánimemente "Reina Mora". También se obtuvo información acerca de la captura de pichones y jóvenes de la especie, que son vendidos a los turistas como mascotas, especialmente por parte de indios tobas y maticos.

La primera mención para la Argentina corresponde a HOY (1968), que la da como *Icterus croconotus paraguayae* para Tres Pozos, Departamento Patiño, Provincia de Formosa. El mismo autor obtuvo un ejemplar cazado por un vendedor de pájaros procedente de Estanislao del Campo, también en Formosa. En Tres Pozos se avistaron cuatro ejemplares en un solo día. Según informaciones de un vendedor local, en Estanislao del Campo se cazan aproximadamente veinte ejemplares por año.

CARMAN (1971) informa que, a raíz de la publicación de una fotografía de este ictérido en una revista de divulgación, recibió algunas cartas dándole cuenta de la presencia en la Argentina de la especie, en las provincias de Formosa, Chaco y Salta, pero sin citas documentadas ni referidas a localidades en particular.

BANCHS (Com. pers.) observó un ejemplar en Las Lomitas, en el centro de la Provincia de Formosa, en enero de 1988.

SHORT (1976) sinonimiza la subespecie *paraguayae* descrita por BRODKORB (1937) para un paraje situado a 235 km al oeste de Puerto Casado, en el Chaco Boreal, con *Strictifrons* TODD, 1924, con localidad típica en Chiquitos, Bolivia.

Las referencias paraguayas son escasas y todas chaqueñas: la mencionada de BRODKORB (1937); una de STEINBACHER (1962) para Filadelfia; otra del mismo autor para Orceta (1968); y una de LOPEZ (1985) para Bahía Negra, en la costa chaqueña del Alto Río Paraguay.

MAZZA (1929) comenta que desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia "suelen traer los arrieros cantidades de maticos, muchos de los cuales perecen durante el trayecto tan largo, en mula, desde ese departamento boliviano hasta Salta o Jujuy", donde eran vendidos a altos precios como mascotas.

CONTRERAS (*in litt.*) pudo ver tres ejemplares en el Inventario Biológico Nacional, de Asunción, Paraguay, procedentes del Parque Nacional Teniente Enciso, Nueva Asunción, Chaco Boreal. En un trabajo en prensa de HAYES y ARECO aparece mencionado como común en la zona de Choré, Departamento San Pedro, Paraguay, siendo ésta la única cita

I. cayanensis Hayes, 1988

al este del Río Paraguay, ya cerca de Matto Grosso, donde la subespecie está presente (HELLMAYR, 1937).

El 8 de octubre de 1987, en la localidad de Santa Ana (25° 33' S y 60° 36' W) fue observada una pareja del Picaflor de Vientre Negro (*Anthracothorax nigricollis nigricollis*). Al día siguiente se observaron nuevamente ejemplares de la especie, de ambos sexos, en el paraje Puesto Rojas, ex Puesto Maguna (30° 00' S, 60° 48' W), y el 11 de octubre otros en la ya mencionada localidad de Bajada Alta. En todos los casos, los individuos fueron observados muy cerca de cursos de agua temporarios o permanentes, principalmente en las costas del Río Bermejito o Teuquito y en las del Riacho Salado. El área se caracteriza por la presencia de Chañar (*Geoffroea decorticans*), Viraró (*Pterogyne nitens*), Palo Bolilla (*Sapindus saponaria*) y Palo Flojo (*Cathormium polyanthum*), con abundante sotobosque y epífitas.

El conocimiento de la especie en la Argentina cuenta con escasos antecedentes: PE-REYRA (1953) obtuvo un ejemplar macho joven cazado por el Sr. Alberto PROSEN en Puerto Iguazú, Misiones. ESTEBAN (1953) cita un ejemplar de la Isla Apipé Grande, Departamento Ituzaingó, Provincia de Corrientes, siendo ésta la única referencia correntina. NAROSKY (1983) se refiere a un ejemplar visto en 21 de febrero de 1974 en Bouvier, Formosa, y es el único dato conocido para el área chaqueña argentina. En la Colección Ornitológica del Instituto Miguel Lillo de Tucumán hay dos ejemplares procedentes, respectivamente, de Puerto Segundo y de Bonpland, Provincia de Misiones.

En el Paraguay hay pocas citas, pero ellas cubren desde el Alto Paraná (BERTONI, 1913), hasta el Chaco Boreal, en Orloff (STEINBACHER, 1962). Existen algunas referencias para localidades cercanas a Formosa, como Lambaré, cerca de Asunción (BERLEPSCH, 1887). AZARA (1802) lo cita, seguramente referido a Asunción, ciudad en la que residió largo tiempo. BERTONI (1930) lo menciona para Monte Sociedad, en el Bajo Chaco, Departamento Presidente Hayes.

Concluyendo el presente registro de *Icterus icterus strictifrons* constituye la primera cita para la Provincia del Chaco y la segunda para el país, siendo además, la más austral. En lo referente a *Anthracothorax nigricollis nigricollis*, también se trata de la primera cita para la Provincia del Chaco, el sexto registro para la Argentina y el más occidental para el país.

AGRADECIMIENTOS: A los amigos y compañeros de viaje, Valeria VERGARA, Guillermo GIL y Rubén ZIRUFIÓ; a todos los integrantes del equipo humano de la Consultoría Grimaux y Asociados, por su valiosa colaboración y por su interés en la preservación de las áreas naturales chaqueñas; y a Julio Rafael CONTRERAS por su aporte de información y asesoramiento bibliográfico.

BIBLIOGRAFIA

- AZARA, F. de. 1802. *Apuntamientos para la Historia Natural de los Pájaros del Paraguay y Río de la Plata*. Imprenta de la Viuda de Ibarra, Madrid.
- BERLEPSCH, H. von. 1887. Systematisches Verzeichniss der von Herrn Ricardo Rohde in Paraguay gesammelten Vögel. *J.f. Orn.*, 1887: 1-37 + Appendix, pp. 113-134.
- BERTONI, A. de W. 1914. *Fauna Paraguaya. Catálogos sistemáticos de los Vertebrados del Paraguay*. Talleres Gráficos M. Brossa, Asunción, pp. 1-86.
- BERTONI, A. de W. 1930. Sobre ornitología del Chaco Paraguayo. Aves colectadas por Félix Possner en la Colonia "Monte Sociedad", hoy Benjamín Aceval (Villa Hayes). *Rev. Soc. Cient. Paraguay*, 2: 241-257.
- BRODKORB, P. 1937. New noteworthy birds from the Paraguayan Chaco. *Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Michigan*, (345): 1-2.
- CARMAN, R.L. 1971. Información sobre el Matico. *Hornero*, 11 (2): 127.
- ESTEBAN, J.G. 1953. Nuevas localidades para aves argentinas. *Acta Zool. Lill.*, 13: 349-362.
- HAYES, F.E. y F. ARECO de MEDINA. (En prensa). Composición y ecología general de la avifauna de Choré, Departamento San Pedro, Paraguay. *Hornero*.
- HELLMAYR, C.E. 1937. Catalogue of the Birds of the Americas and the adjacent Islands. Part X. Icteridae. *Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser.*, 13 (10): i-v + 1-228.

- HOY, G. 1968. *Icterus jamaicai paraguayae* (Brodkorb). Un icterido (Aves) nuevo para la fauna argentina. *Neotrópica*, 14 (45): 118.
- LOPEZ, N. 1985. Avifauna del Departamento de Alto Paraguay. *Volante Migratorio*, (4): 9-13.
- MAZZA, S. 1929. Curiosos hábitos domésticos de un Ictérico en Bolivia. *Hornero*, 4 (3): 310.
- NAROSKY, T. 1983. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. *Hornero*, 12 (2): 122-126.
- PEREYRA, J.A. 1950. Avifauna argentina. *Hornero*, 9 (2): 178-241.
- SHORT, L.L. 1976. Notes on a collection of birds from the Paraguayan Chaco. *Amer.Mus.Novitates*, (2597): 1-16.
- STEINBACHER, J. 1962. Beiträge zur Kenntnis der Vögel von Paraguay. *Abh.Senck.Natur.Ges.*, 502: 1-106.
- STEINBACHER, J. 1968. Weitere Beiträge über Vögel von Paraguay. *Senckenb. Biol.*, 49 (5): 317-365.

1 Fundación Vida Silvestre Argentina, Defensa 245, Piso 6, Dto. K, 1065 Buenos Aires, ARGENTINA.

II ENCUENTRO ARGENTINO-PARAGUAYO DE ORNITOLOGIA

Asunción, 4 al 7 de mayo de 1989

La Comisión Organizadora del II Encuentro de Ornitología ha resuelto poner en circulación esta serie de *Nótulas Faunísticas* como medio de comunicación con el ambiente ornitológico argentino y paraguayo, reemplazando las clásicas circulares con aportes al conocimiento ornitológico —especialmente ornitogeográfico—, que esperamos sean bienvenidas y se transformen en el medio de comunicación permanente de futuras reuniones. Se invita a los interesados a remitir sus notas, las que deben contener novedades faunísticas o taxonómicas con una extensión no mayor de 350 palabras. Los autores deben contribuir al costo editorial según precios que se comunicarán como respuestas a consultas, recibiendo 100 ejemplares del número con su aporte.

Informaciones acerca del II Encuentro

Comunicaciones Científicas - Conferencias - Presentación de Posters -
Cursillos - Mesas Redondas - Excursiones ornitológicas.

Presidente de la Comisión Organizadora: Dr. Narciso González Romero

Los resúmenes deben ser presentados antes del 20 de marzo de 1989 y cada uno de ellos debe tener los nombres completos de los autores y su dirección.

Los resúmenes no deberán exceder las 250 palabras.

El autor debe especificar si se trata de una comunicación oral o si será presentado mediante poster.

Los temas pueden referirse a Ornitología de Argentina y del Paraguay, o a temas de Ornitología General.

Inscripción: su costo, hasta el 20 de marzo de 1989, es de 12 dólares o su equivalente en moneda nacional de los países participantes en el momento del pago.

Los participantes argentinos pueden inscribirse mediante el Coorganizador local, Julio Rafael CONTRERAS, Casilla de Correo 26, 3400 Corrientes. Cheques y/o giros a su nombre.

Los resúmenes presentados por autores argentinos se remitirán al mencionado Coorganizador, *debiendo estar en Corrientes, en una fecha anterior al 20 de marzo* pues de lo contrario será imposible su edición previa.

Estadía en Asunción: La Comisión Organizadora está gestionando posibilidades de alojamiento económico para los participantes que quieran ese beneficio. El clima de Asunción en la primera quincena de mayo es templado, con días tibios, pudiendo darse algunos días fríos, pero muy moderados.

Los participantes argentinos recibirán información completa acerca de alojamiento, comidas, direcciones a las que acudir y horario de las sesiones previamente a la iniciación de la reunión.

Para cruzar la frontera el único requisito es la presentación de Documento Nacional de Identidad o Cédula de Identidad.