

BDC P  
OK

# NOTULAS FAUNISTICAS

ISSN-0327-0017

- 1989 -

Nº 19

## NOTAS ORNITOLÓGICAS PARAGUAYAS. LA PALOMITA ESCAMOSA *Columbina squammata squammata* (LESSON, 1831)

Julio Rafael CONTRERAS (1) y Narciso GONZALEZ ROMERO (2)

### ORNITHOLOGIC NOTES FROM PARAGUAY. I. THE SCALED DOVE *Columbina squammata squammata* (LESSON, 1831)

#### SUMMARY

*On the ground of all Paraguayan known records of the Scaled Dove (many of them unpublished) the range of the species is discussed. A specimen collected on the westernmost Chaco, near Fortín Nueva Asunción, shows a scattered connection between previously known Paraguayan and Bolivian populations.*

La presencia de la Palomita Escamosa en el Paraguay fue enunciada por primera vez por DABBENE (1920: 134) en base a información de A. de W. BERTONI para Aguaray-Guazú, "al norte del Paraguay", donde fuera observada en abril de 1920.

Posteriormente HELLMAYR (1929: 465) da a conocer un ejemplar obtenido en Villarrica, seguramente a principios del siglo. La cita siguiente corresponde a LAUBMANN (1933: 289), cuando comunicara la colección de varios ejemplares en Colonia Nueva Germania y en Zanja Morotí.

Las menciones subsiguientes son relativamente escasas, pero van definiendo un área cada vez más amplia de residencia, o, al menos, de probable presencia de la especie en el Paraguay, abarcando de este a oeste toda la extensión del país.

Los registros hasta ahora conocidos son los siguientes:

DABBENE, 1920: 134: Aguaray-Guazú, Alto Paraguay, IV. 1920 (19° 51' S - 58° 31' W)

HELLMAYR, 1929: 465. Villarrica, Guayrá, s./f. (25° 45' S - 56° 26' W)

LAUBMANN, 1933: 289. Colonia Nueva Germania, San Pedro, I, II. 1932 (23° 54' S - 56° 34' W)

*Ibid.*: Zanja Morotí, "Apa Bergland", Concepción, XI. 1931 (22° 06' S - 58° 02' W)

(1) CAPRIM, CONICET - Gobierno de la Provincia de Corrientes, Casilla de Correo 145, 3400 Corrientes, ARGENTINA

(2) ICB - UNA, Casilla de Correo 1039, Asunción, PARAGUAY

NOTULAS FAUNISTICAS	Nº19	1989	Pp. 1-3	CORRIENTES, ARGENTINA
---------------------	------	------	---------	-----------------------

PINTO, 1949: 275. Horqueta, Concepción, S./f. (23° 24' S - 56° 53' W)  
*Ibid.*: Cerro Amambay, Amambay, s./f. (23° 10' S - 55° 30' W)  
STEINBACHER, 1968: 322. Lichtenau, Presidente Hayes, III.1963 (22° 49' S - 59° 39' W)  
SHORT, 1976: 5. Lichtenau, Presidente Hayes, I, V, entre 1964 - 1970.  
HAYES y ARECO, 1988: 61. Choré, San Pedro, s./f. (24° 10' S - 56° 35' W)  
CONTRERAS, A. et al., 1989: 19. Puente Kyhá, Canindeyú, I. 1989 (24° 05' S - 54° 34' W)  
DLOUHY, C. (Com. pers.), Río Carapá, Canindeyú, X.1978 (24° 12' S - 54° 34' W)  
*Ibid.*: Arroyo Pirá Pytá, Alto Paraná, IX. 1980 (25° 18' S - 54° 37' W)

Por último, los autores obtuvieron un ejemplar el 10.IX. 1989 en la Estancia Cöé Pyahú, 5 kilómetros al oeste del Fortín Nueva Asunción, 20° 38' S - 61° 57' W, siendo éste el cuarto hallazgo chaqueño y uno de los más occidentales de la geonemia conocida de la subespecie *squammata* (GOODWIN, 1977: 232). La única referencia más al oeste de Cöé Pyahú es Santa Cruz, Bolivia (SHORT, 1975: 222).

*Columbina squammata* se caracteriza por frecuentar ambientes subhúmedos y secos de cerrados, campos y sabanas (SHORT, 1975: 222; SICK, 1986: 289) y también zonas abiertas y de desmonte de ambiente selvático, habiendo invadido así áreas modificadas de Espirito Santo, Brasil (SICK, 1986) y de Misiones, Argentina (PARTRIDGE, 1961). El ejemplar citado de Puente Kyhá y los avistamientos efectuados en localidades cercanas a la Represa de Itaipú (PEREZ VILLAMAYOR y COLMAN JARA, com. pers.) corresponderían a este último tipo de expansiones.

Los hallazgos chaqueños se distribuyen en los meses de enero, marzo, abril, mayo y septiembre, permitiendo suponer una presencia continua de *Columbina squammata*, la que anidaría localmente

La baja densidad local de una especie como la Palomita Escamosa, que en su distribución central es muy numerosa y frecuente, podría deberse al carácter marginal de las localidades del oeste paraguayo en relación con su geonemia o, podría tratarse de una expansión local todavía incipientemente asentada.

## AGRADECIMIENTOS

A Yolanda Ester DAVIES, a Carlo DLOUHY, a Nelson Aquiles PEREZ VILLAMAYOR, a Andrés COLMAN JARA y a Andrés Oscar CONTRERAS por su información de campo generosamente brindada. A Don César CALVET y a su esposa por la amable hospitalidad en la Estancia Cöé Pyahú, en Nueva Asunción.

## BIBLIOGRAFIA

CONTRERAS, A. O.; C. VITALE y Y. E. DAVIES. 1989. Una faunula local del Departamento Canindeyú, Paraguay: la de Puente Kyhá. *Resúmenes II Enc. Paraguayo- Argentino Ornitol.*, pp. 19 - 20.

- HELLMAYR, Ch. E. 1929. Catalogue of the Birds of the Americas. *Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser.*, 13 (4): 1 - 258.
- LAUBMANN, A. 1933. Beiträge zur Avifauna Paraguay's. *Anz. Orn. Ges. Bayern*, 2 (7): 287 - 302.
- PARTRIDGE, W. H. 1961. Aves de Misiones Nuevas para la Argentina. *Neotrópica*, 7 (22): 25 - 28.
- PINTO, O. 1949. Esboço Monográfico dos Columbidae Brasileiros. *Arq. Zool. Est. São Paulo*, 7 (3): 241 - 324.
- SHORT, L. L. 1975. A Zoogeographic Analysis of the South American Chaco Avifauna. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 154 (3): 163 - 352.
- SHORT, L. L. 1976. Notes on a Collection of Birds from the Paraguayan Chaco. *Amer. Mus. Novitates*, (2597): 1 - 16.
- SICK, H. 1986. *Ornitologia Brasileira. Volume 1*. Editora Universidade de Brasília, Brasília, pp. i - xix + 1 - 481.
- STEINBACHER, J. 1968. Weitere Beiträge über Vögel von Paraguay. *Senckenbergiana Biol.*, 49: 317 - 365.

### NOTULAS FAUNISTICAS

Boletín de Ciencias Naturales de aparición no periódica  
Editor Responsable: Julio Rafael CONTRERAS  
Casilla de Correo 26, 3400 Corrientes, ARGENTINA.