

# NOTULAS FAUNISTICAS

ISSN-0327-0017

- 1992 -

Nº 28

NOTAS ORNITOLÓGICAS PARAGUAYAS. I. *Sterna maxima maxima* BODDAERT, 1783 y *Anthracothorax nigricollis nigricollis* (VIEILLOT, 1817)

Julio Rafael CONTRERAS (1)

NOTES ON OPARAGUAYAN BIRDS. I. *Sterna maxima maxima* BODDAERT, 1783 AND *Anthracothorax nigricollis nigricollis* (VIEILLOT, 1817)

## SUMMARY

*A recent sight record of Sterna maxima maxima at the City of Pilar, Ñeembucú Department, incorporates that species to the Paraguayan Avifauna and agrees with an old record in the neighbouring region of Argentina. On the basis of some historical bibliographic and unpublished records the status and distribution of Anthracothorax nigricollis nigricollis in Paraguay is revised and discussed.*

### *Sterna maxima maxima* BODDAERT, 1783

Este gaviotín, "de tamaño grande, aproximadamente como una Gaviota de Capucho Negro (*Larus maculipennis*), pero de patas mucho más cortas, cola ahorquillada y pico voluminoso" (ESCALANTE, 1970: 165) es considerado de hábitos costeros marinos. MEYERDESCHAUENSEE (1971: 88) dice que no remonta ríos y no existen datos bibliográficos sobre su presencia en ambientes continentales, excepto una cita de ESTEBAN (1953: 352) que da cuenta de la captura de un ejemplar de *Sterna maxima maxima* en la Isla Apipé Grande (27° 30' S - 56° 54' W), en el Departamento de Ituzingó, Provincia de Corrientes, República Argentina, el 24.X.1950.

Corresponde asociar a este hallazgo el avistamiento de un ejemplar sobrevolando la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú (26° 52' S - 58° 23' W), muy cerca de la costa del Riacho Ñeembucú, el 10.IX.1992. Tenía plumaje de reposo, con la corona blanca grisácea. Se desplazaba con el típico vuelo que describe BELTON (1984: 522): "flies with slow, leisurely, gentyle motion of very long wings, rather gull-like and with some resemblance to flight of *Vanellus chilensis*". Es evidente que se trata de una observación muy rara que reitera la ocasional ingresión de la especie en aguas continentales. Es la primera vez que se registra a *Sterna maxima maxima* en territorio paraguayo, por más que la cita de Apipé Grande se produjo a pocos kilómetros de la frontera paraguayo - argentina.

### *Anthracothorax nigricollis nigricollis* (VIEILLOT, 1817)

Se trata de una especie perteneciente a un género politépico. Según algunos autores sería monotípi-

(1) PROBBBAS - CONICET, Casilla de Correo 26, 3400 Corrientes, ARGENTINA.

NOTULAS FAUNISTICAS	Nº 28	1992	Pp. 1-4	CORRIENTES, ARGENTINA
---------------------	-------	------	---------	-----------------------

ca (MEYER DE SCHAUENSEE, 1966: 165; 1971: 137; SHORT, 1975: 239; BELTON, 1984: 568) y polítípica según otros (CORY, 1918: 222; HELLMAYR, 1929: 388; LAUBMANN, 1940, 2: 15; OLROG, 1979: 141; FFRENCH, 1976: 247; RUSCHI, 1983: 226; GRANTSAU, 1989: 67). El problema queda abierto y es inabordable sin contar con colecciones a nivel continental, razón por la que, a pesar de los argumentos de SHORT (1975: 239), se prefiere retener la validez de las subespecies, dada la autoridad de quienes sustentan las posiciones opuestas a la de ese autor.

Su ecología es escasamente conocida. Se considera que es habitante de bordes de formaciones boscosas, entre matorrales bajos, y es capaz de alcanzar ambientes antropógenos y jardines. Existen datos sobre migración de algunas poblaciones (RUSCHI, 1967; FFRENCH, 1976; BELTON, 1984), pero SHORT (1975: 240) dice que no es migrante. La cuestión queda zanjada definitivamente con los resultados de anillamientos y recuperaciones efectuados por RUSCHI (1983: 227) que definen a la especie como migradora a gran distancia. En Paraguay los registros abarcan el período de los meses X a V, pero no hay todavía evidencia de que sea un anidante local.

Dada a conocer para el Paraguay por AZARA (1802 = 1942, 4: 68, 69), quien no menciona localidad pero sí una fecha: diciembre. Fué redescubierta por BERLEPSCH (1887: 17) en Lambaré, Departamento Central (25° 21' S - 57° 39' W) y posteriormente por BERTONI (1914: 47) en Puerto Bertoni, Departamento Alto Paraná (25° 38' S - 54° 40' W) y en Encarnación, Departamento Itapúa (27° 20' S - 55° 54' W), y más tarde (BERTONI, 1930: 247) la señala para Monte Sociedad, Departamento Presidente Hayes (ca. 25° 05' S - 57° 52' W). LAUBMANN (1940, 2: 15) da a conocer dos ejemplares cazados en 1911 en Concepción, Departamento Concepción (23° 25' S - 57° 17' W) y otro en la década 1930 - 1940 en Encarnación, Departamento Itapúa. La última cita bibliográfica conocida corresponde a STEINBACHER (1962: 55) para Orloff, Departamento Boquerón (22° 15' S - 60° 00' W), el 10.V.1957. Andrés COLMAN JARA y Nelson PEREZ VILLAMAYOR (com. pers.) comprobaron que la especie puede considerarse relativamente común en la zona de la Represa de Itaipú, entre Ciudad del Este, Departamento Alto Paraná (25° 37' S - 54° 37' W) y los Saltos del Guayrá, Departamento Canindeyú (24° 05' S - 54° 15' W).

Ulteriores registros corresponden a Luque, Departamento Central (25° 16' S - 57° 34' W), el 25.XII.1990 (N.P.V. y A.C.J., com. pers.) y a un jardín urbano de la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú (26° 52' S - 58° 23' W), donde el autor observara una pareja el 27.II.1992, el 8.III.1992 y el 5.IV.1992. En la misma Ciudad de Pilar, R. MIATELLO y A. R. GIRAUDO (com. pers.) vieron un ejemplar, también en un jardín urbano, el 14.X.1992.

Las observaciones y datos de colección en la Argentina son escasos y no permiten juzgar acerca de la residencia anual y la anidación en las Provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa (BERTONATTI y HEINONEN FORTABAT, 1988: 2). En el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, donde es poco común (BELTON, 1984: 568) ha sido descubierto anidando, hay registros hasta el mes de mayo y podría ser un "migrante parcial" según BELTON. La mencionada cita de ESTEBAN (1953: 353) procedente de la Isla Apipé Grande, en la provincia argentina de Corrientes es extrapolable para el sur del Departamento Misiones del Paraguay y está reforzada por el registro de la especie en Puerto Valle, Departamento Ituzingó, Provincia de Corrientes (27° 37' S - 56° 26' W), donde se vieron algunos ejemplares en la segunda quincena de enero de 1990 (obs. pers.). Además, el 24.III.1978, el autor comprobó la presencia de *Anthracothorax nigricollis nigricollis* en Paso Mbaracayá, Departamento Ituzingó, Corrientes (27° 25' S - 56° 45' W) y A. R. GIRAUDO (com. pers.) observó una pareja de este picaflor en la punta oeste de la Isla Apipé Grande, sobre el Río Paraná, el 23.I.1991. En la provincia argentina de Misiones, los datos sobre la especie son escasos y se dan

en el período comprendido entre el 11.IX. y el 7.III (CONTRERAS y CHEBEZ, M. S.).

Como puede verse en la Figura 1, la distribución regional tiende a concentrarse a lo largo de las vías fluviales mayores de la zona

Es evidente la necesidad de nuevos aportes acerca de la biología y la fenología de esta interesante especie cuya distribución general abarca gran parte de América Tropical extraandina, desde el oeste de Panamá hasta el norte argentino, Bolivia, Paraguay y el sudeste de Brasil.

### AGRADECIMIENTOS

A Andrés Oscar CONTRERAS y a Yolanda Ester DAVIES que participaron de las actividades de campo.

### BIBLIOGRAFIA

- AZARA, F. de. 1942. (1802). *Apuntamientos para la Historia Natural de los Pájaros del Paraguay y Río de la Plata*. Reimpresión de la obra por la Biblioteca Americana, Buenos Aires, 1940 - 1942. Tomo IV, pp. i - x + 1 - 262.
- BELTON, W. 1984. Birds of Rio Grande do Sul, Brasil. Part. 1. Rheidae through Furnariidae. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 178 (4): 369 - 636.
- BERLEPSCH, H. von. 1887. Systematisches Verzeichniss der von Herrn Ricardo RHODE im Paraguay Gesammelten Vögel. *J. f. Orn.*, 1887: 1 - 37 + Appendix, pp. 113 - 134.
- BERTONATTI, C. A. y S. HEINONEN FORTABAT. 1988. Dos especies nuevas para la Provincia del Chaco, República Argentina. *Nótulas Faunísticas*, (14): 1 - 3.
- BERTONI, A. de W. 1914. *Fauna Paraguaya. Catálogos Sistemáticos de los Vertebrados del Paraguay*. Talleres Gráficos M. Brossa, Asunción, pp. 1 - 86.
- BERTONI, A. de W. 1930. Sobre Ornitología del Chaco Paraguayo. Aves colectadas por Félix POSSNER en la "Colonia Monte Sociedad", hoy Benjamín Aceval (Villa Hayes). *Rev. Soc. Cient. Paraguay*, 2: 241 - 257.
- CONTRERAS, J. R. y J. C. CHEBEZ. (M. S.). *Atlas Ornitogeográfico de la Provincia de Misiones. República Argentina* (Inédito).
- CORY, C. B. 1918. Catalogue of the Birds of the Americas. *Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser.*, 13, Part II (1): 1 - 315.
- ESCALANTE, R. 1970. *Aves Marinas del Río de la Plata y aguas vecinas del Océano Atlántico*. Barreiro y Ramos, Montevideo, pp. 1 - 199.
- ESTEBAN, J. G. 1953. Nuevas localidades para aves argentinas. *Acta Zool. Lill.*, 13: 249 - 265.
- FFRENCH, R. 1976. *A Guide to the Birds of Trinidad and Tobago*. Harwood Books, Valley Forge, pp. i - xix + 1 - 470.
- GRANTS AU, R. 1989. *Os Beija-Flores do Brasil*. *Expressão e Cultura*, Rio de Janeiro, pp. 1 - 233.
- HELLMAYR, C. E. 1929. A Contribution to the Ornithology of Northeastern Brazil. *Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser.*, 12 (18): 235 - 501.
- LAUBMANN, A. 1940. *Die Vögel von Paraguay*. Strecker & Schröder, Stuttgart, Tomo 2, pp. 1 - 229.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1966. *The Species of Birds of South America with their Distribution*. Livingston Publ. Co., Nurbeth, pp. i - xvii + 1 - 577.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1971. *A Guide to the Birds of South America*. Oliver & Boyd, Edinburgh, pp. i - xiv + 1 - 470.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva Lista de la Avifauna Argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1 - 324.

- PAYNTER, R. A. y A. M. CAPERTON. 1977. Ornithological Gazetteer of Paraguay. Mus. Comp. Zool., Cambridge, pp. i - iv + 1 - 43.
- RUSCHI, A. 1967. Algumas Observações sobre a migração dos Beija-Flores no Brasil. Bol. Mus. Prof. Mello Leitão, Zool., 28 : 1 - 5.
- RUSCHI, A. 1983. Aves do Brasil. Vol. V. Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, pp. 205 - 452.
- SHORT, L. L. 1975. A Zoogeographic Analysis of the South American Chaco Avifauna. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 154 (3): 163 - 352.
- STEINBACHER, 1962. Beiträge zur Kenntnis der Vögel Paraguay. Abhandl. Senckenber. Natur. Gesell., 502 : 1 - 106.




Figura 1. Modalidades de la distribución conocida de *Anthracothorax nigricollis nigricollis* (VIEILLOT, 1817) en Paraguay. En algunos casos se extrapolan datos fronterizos cuando éstos proceden de la margen opuesta de los ríos limítrofes. El retículo utilizado es de 0,5 x 0,5 grado geográfico (0,25 latilong).

#### NOTULAS FAUNISTICAS

Boletín de Ciencias Naturales de aparición no periódica.  
 Editor Responsable: Julio Rafael CONTRERAS  
 Casilla de Correo 26, 3400 Corrientes, ARGENTINA.