

NOTULAS FAUNISTICAS

ISSN-0327-0017

- 1992 -

N° 31

NOTAS ORNITOLÓGICAS PARAGUAYAS. III. *Sterna trudeaui* AUDUBON, 1838, UNA ESPECIE NUEVA PARA EL PARAGUAY Y NUEVOS DATOS SOBRE OTRAS TRES

Julio Rafael CONTRERAS (1) y Andrés Oscar CONTRERAS (2)

ORNITHOLOGICAL NOTES FROM PARAGUAY. III. *Sterna trudeaui* AUDUBON, 1838, A NEW SPECIES FOR THE COUNTRY AND NEW DATA ON OTHER THREE SPECIES

SUMMARY

A revision of known status and distribution of four species of Paraguayan Birds are made giving new sight and collection records. One of them, *Sterna trudeaui* is a new species for Paraguay. The other three species are: *Emberizoides ypiranganus*, *Nycticryphes semicollaris* and *Falco rufigularis*.

Emberizoides ypiranganus IHERING, 1908

Esta especie monotípica, que es habitante de sabanas con formaciones boscosas (SHORT, 1975: 320) fue citada para el Paraguay por EISENMANN y SHORT (1982: 6), quienes dan cuenta de un ejemplar obtenido en el mes de noviembre en San Luis de la Sierra, Departamento Concepción (22° 25' S - 57° 27' W). Otro ejemplar de la especie fue obtenido el 19.VII.1979, a 13 kilómetros al norte de Curuguaty, Departamento Canindeyú (24° 27' S - 55° 42' W) (N. PEREZ VILLAMAYOR y A. COLMAN JARA, com. pers.). También ha sido avistada por los autores en los pajonales semi inundados que se extienden al oeste de la Ruta Nacional IV, entre los Arroyos Dos Hermanas y Montuoso, en el Departamento Ñeembucú (ca. 26° 47' S - 58° 12' W), donde unos pocos ejemplares se veían cerca de *Emberizoides herbicola*, *Embernagra platensis*, *Alectrurus risora*, *Leistes superciliaris*, *Pseudoleistes guirahuro* y *Sporophila collaris*, entre el 11 y el 23.I.1992.

Nycticryphes semicollaris (VIEILOT, 1816)

Esta especie ha sido descrita en base al "Chorlito Golas Oscura y Blanca", N° 405 de AZARA (1802 (1942, 5 : 139)) que ha sido mencionada para diversas localidades paraguayas por distintos autores: por KERR (1901: 236), en Waikthlatingmayalwa, Departamento Presidente Hayes (22° 35' S - 58° 10' W); por BERTONI (1914: 39), en Puerto Bertoni, Departamento Alto Paraná (25° 38' S - 54° 40' W); por STEINBACHER (1962: 36), 115 kilómetros al este de Orloff, Departamento Presidente Hayes (ca. 22° 15' S - 58° 50' W), el 1.XI.1955; y por SHORT (1976: 5) en Lichtenau, Departamento Presidente Hayes, el 12.II.

NOTULAS FAUNISTICAS	N° 31	1992	Pp. 1-3	CORRIENTES, ARGENTINA
---------------------	-------	------	---------	-----------------------

Con respecto al comportamiento anual de la especie hay datos contradictorios. Para MYERS y MYERS (1979: 195), *Nycticryphes semicollaris* llega al Paraguay en migración invernal ("wintering in Brazil and Paraguay"). Sin embargo, HAYMAN et al. (1986: 222) definen a la especie como no migratoria sino capaz de realizar desplazamientos de corto alcance en respuesta a las condiciones locales. Los datos disponibles demostrarían la residencia y la reproducción de la especie en Paraguay. Por ejemplo, SHORT (1976: 5) examinó ejemplares, dos machos y dos hembras, que estaban todos en plena actividad reproductiva. El hallazgo de un ejemplar de *Nycticryphes semicollaris* en Paso Lengá, Ñeembucú (26° 54' S - 58° 22' W) el 22.I.1992 contribuye a reforzar la posibilidad de que exista una residencia permanente de la especie en territorio paraguayo, al menos de cierto número de ejemplares, ya que habría un aporte invernal de individuos venidos de otras latitudes.

Sterna trudeaui AUDUBON, 1838

Es una especie habitante de ríos y lagunas, y de costas marinas, que se reproduce en aguas continentales. Hasta ahora no había sido citada para el Paraguay, donde fue observada por los autores el 7.V.1989 sobre el Río Paraguay, frente a Itá Enramada, Departamento Central (ca. 25° 37' S - 57° 30' W). Después se avistó un ejemplar sobrevolando el Puerto Nuevo de Pilar, Departamento Ñeembucú (26° 52' S - 58° 23' W) el 10.I.1992. El 17.IX.1992, en un recorrido fluvial por el Río Paraguay, entre Pilar y Puerto Naranjito (26° 56' S - 58° 27' W), se observó un ejemplar por la mañana y otros diez por la tarde, todos sobrevolando las aguas del Río. Otras observaciones complementarias se efectuaron en territorio argentino: el 5.III.1989 en Laguna Pampín, Departamento Capital, Provincia de Corrientes (27° 28' S - 58° 52' W); en el Puerto de la Ciudad de Corrientes (27° 28' S - 58° 58' W) el 18.IX.1991; y en el Paraje Mbarigüí, Departamento Berón de Astrada, Provincia de Corrientes (27° 33' S - 57° 31' W), el 12.VII.1990. Posiblemente se trata de ejemplares o de grupos de ellos de carácter transgresivo que se aventuran hacia el norte a través del eje fluvial Paraná-Paraguay, internándose también en cursos y cuerpos de agua laterales. Sin embargo, esa presencia podría ser bastante asidua y hasta el presente haber sido subobservada.

Falco ruficularis DAUDIN, 1800

El 3.IX.1992 se observó una pareja en Paso Horqueta, sobre el Río Aquidabán, en el Departamento Concepción (ca. 23° 06' S - 57° 23' W) en el borde del camino que lleva a Colonia San Alfredo, en un área bastante degradada por desmonte e incendio. Tenían su nido en el hueco de la emergencia de una rama rota, en un gigantesco guayaibí seco de aproximadamente 35 metros de altura. El nido estaba a más de veinte metros del suelo. Ambas aves permanecían expectantes en el mismo árbol. El macho realizaba revuelos cortos, la hembra permanecía quieta en lo alto de la copa, acechando el nido. Muy cerca, en una rama menor dormía un ejemplar de *Lurocalis semitorquatus*. *Falco ruficularis* cuenta con varios registros ampliamente distribuidos en el Paraguay meridionalmente a los 32° de latitud sur, tanto en el Chaco Boreal como en la Región Oriental. Algunos de ellos son recientes: una hembra en la Reserva de Itabó, en el Departamento Alto Paraná, el 25.XI.1985 y un ejemplar en Puesto Guayaquí, Departamento Caaguazú, el 12.IX.1991 (ambos datos comunicados por N. PEREZ VILLAMAYOR y A. COLMAN JARA).

AGRADECIMIENTOS

A Narciso GONZALEZ ROMERO, a Yolanda Ester DAVIES, a Nelson PEREZ VILLAMAYOR, y a Andrés COLMAN JARA, que aportaron su cooperación en las tareas de campaña o proveyeron información utilizada en esta nota.

BIBLIOGRAFIA

- AZARA, F. de. 1942 (1802). *Historia Natural de los Pájaros del Paraguay y del Río de la Plata*. Reimpresión de la Obra por la Biblioteca Americana, Buenos Aires, 1940 - 1942. Tomo V, pp. i - xi + 1 - 265.
- BERTONI, A. de W. 1914. *Fauna Paraguaya. Catálogos sistemáticos de los Vertebrados del Paraguay*. Talleres Gráficos M. Brossa, Asunción, pp. 1 - 86.
- EINSENMANN, E. y L. L. SHORT. 1982. Systematics of the Avian genus *Emberizoides* (Emberizidae). *Amer. Mus. Novitates*, (2740): 1 - 21.
- HAYMAN, P. ; J. MARCHANT y T. PRATER. 1986. *Shorebirds*. Crown & Helm, London & Sidney, pp. 1 - 412.
- MYERS, J. P. y L. P. MYERS. 1979. Shorebirds of coastal Buenos Aires Province. *Ibis*, 121 (2): 186 - 200
- SHORT, L. L. 1976. Notes on a Collection of Birds from the Paraguayan Chaco. *Amer. Mus. Novitates*, (2597): 1 - 16.
- STEINBACHER, J. 1962. Beiträge zur Kenntnis der Vögel Paraguay. *Abhandl. Senckenberg. Natur. Gesell.*, 502: 1 - 106.

NOTULAS FAUNISTICAS

Boletín de Ciencias Naturales de aparición no periódica
Director Responsable: Julio Rafael CONTRERAS
Casilla de Correo 26, 3400 Corrientes, ARGENTINA.