
NOTULAS FAUNISTICAS

ISSN-0327-0017

- 1993 -

N° 48

NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA SIERRA GRANDE, DEPARTAMENTOS SAN ALBERTO, SANTA MARIA Y PUNILLA, PROVINCIA DE CORDOBA, REPUBLICA ARGENTINA.

Jorge L. BALDO (1) y Mariano ORDANO (2)

NEW RECORDS OF BIRDS FROM THE SIERRA GRANDE, DEPARTAMENTS OF SAN ALBERTO, SANTA MARIA AND PUNILLA, PROVINCE OF CORDOBA, ARGENTINA.

SUMMARY

On the basis of recent records from the Sierra Grande, the known range of 16 species of birds are increased. For 10 of that species new data on altitudinal distribution are given. Five species are greatly increasing its range.

Las sierras de la provincia de Córdoba cuentan desde el siglo pasado con diversos inventarios ornitológicos (p. e. STEMPELMANN y SCHULZ, 1890; FRENZEL, 1891; PARTRIDGE, 1953; NORES e YZURIETA, 1983; NORES et al., 1983; NORES, 1986; MIATELLO et al., 1991), sin embargo resta aún mucho por conocer sobre la distribución y desplazamientos altitudinales de sus especies.

Se han realizado, desde enero de 1988, observaciones de aves en varias localidades de Sierra Grande (Departamentos San Alberto, Santa María y Punilla). Durante el año 1992 se llevaron a cabo censos mensuales sistemáticos y también se efectuaron observaciones en enero y junio de 1993. Como resultado parcial de estos estudios se amplía para 10 especies de aves la distribución altitudinal conocida en la Provincia de Córdoba. Se citan además nuevas localidades para otras cinco especies poco conocidas en la provincia y se aclara la condición de permanencia de una de las especies detectadas.

Las localidades prospectadas son las siguientes: San Clemente (1100 m s. n. m.), La Cumbrecita (Departamento Santa María); Quebrada de los Chorrillos, Copina (1450 m s. n. m.), Puesto Pedernera (1500-1650 m s. n. m.), Los Gigantes (2000 m s. n. m.) (Departamento Punilla); Quebrada del Batán (1750 m s. n. m.), Quebrada de los Condoritos (1800 m s. n. m.), La Pampilla (1920 m s. n. m.), El Cóndor (2000 m s. n. m.) y Pampa de Achala (2000-2300 m

(1) Programa de Biología Básica y Aplicada Subtropical (PROBBAS, CONICET) Casilla de Correo 26, 3400 Corrientes, ARGENTINA.

(2) Museo Provincial de Ciencias Naturales "F. Ameghino", Primera Junta 2859, 3000 Santa Fe, ARGENTINA.

NOTULAS FAUNISTICAS	N° 48	1993	Pp. 1-5	CORRIENTES, ARGENTINA
---------------------	-------	------	---------	-----------------------

s. n. m.) (Departamento San Alberto).

Cuando se hace alusión a las zonas periserrana, bajoserrana, altoserrana y llanura chacopampeana, se tiene en cuenta el criterio de NORES et al. (1983: V-VI), siendo la primera una zona comprendida entre los 400 y 700 m., la segunda entre los 700 y 1300 m., la tercera aproximadamente por arriba de los 1500 m., y por último la llanura chacopampeana, desde los 400 m. hacia abajo.

ESPECIES DE LAS CUALES SE ACLARA SU DISTRIBUCION ALTITUDINAL

Nothoprocta pentlandii. Fue observada varias veces en la Quebrada de los Condoritos, en un bosque de tabaquillos (*Polylepis australis*) el 28-IX-1988. Posteriormente se vio un ejemplar en el mismo sitio el 14-XI-1991, y durante 1992 los días 9-III, 5-VIII, 13-XI y 14-XI. El 10-X-1992 fueron vistos dos ejemplares, uno de ellos juvenil. Además, fue observada en Puesto Perdenera durante 1992, los días 1-II, 13-VI, 5-VII, 28-VIII y 10-X; y el 4-I-1993, y en la Quebrada de los Infiernillos (1.900 m. s. n. m.), próxima a la Pampilla, dos ejemplares fueron observados los días 28 y 29-XII-1992. Esta especie, indicada como ocasional hasta la zona altoserrana (NORES et al., 1983: 2), fue observada con cierta frecuencia durante 9 meses del año; por lo cual se trataría de una especie permanente.

Accipiter striatus. Fue observado un ejemplar el 13-VI-1992 en Puesto Perdenera, en un pastizal-pajonal rocoso. También en ese paraje fue observado los días 10-IX-1992, 16-XI-1992 y 4-I-1993 en una pequeña quebrada. El 29-XII-1992 fue visto un ejemplar en la quebrada de los Condoritos, en un bosque de tabaquillos (*Polylepis australis*). La especie había sido citada para las zonas bajoserrana y periserrana (NORES et al., 1983: 15).

Tyto alba. Un ejemplar observado por G. OLMOS (com. pers.) el 28-VIII-1988, en la Quebrada de la Loma de las Coloradas, próxima a la Quebrada de los Condoritos. Posteriormente se observó un ejemplar en Puesto Pedernera el 15-V-1992, y fue observado en el mismo sitio el 10-IX-1992. El 12-X-1992 se observó un ejemplar en la Quebrada de los Infiernillos, próxima a La Pampilla, en un pequeño bosque de tabaquillo (*Polylepis australis*). Además fue escuchado habitualmente en estos sitios. NORES et al. (1983: 41) indican: "solamente no está presente en el piso superior de las Sierras".

Furnarius rufus. Fue observada una pareja con nido en Puesto Pedernera los días 1-II-1992, 28-XII-1992 y 4-I-1993. Otra pareja con nido fue vista en Copina, el 11-IX-1992 y el 30-XI-1992. Además, se observó una pareja con nido los días 27 al 29-XII-1991, 3 y 4-I-1992, 6 al 9-III-1992 y 11 al 13-IV-1992 en el Puesto de Achala. En todos los casos se la encontró asociada a viviendas. La especie había sido indicada hasta la zona bajoserrana (NORES et al., 1983: 53).

Synallaxis frontalis. Se observó un ejemplar en proximidades de la Pampilla el 10-X-1992. En la Quebrada de los Condoritos, en bosques de tabaquillo (*Polylepis australis*), fueron observados tres ejemplares el 10-X-1992, tres ejemplares el 14-XI-1992 y cuatro ejemplares el 16-XI-1992. El 1-II-1992 fue observado un ejemplar con nido en una pequeña quebrada próxima a Puesto Pedernera. En la misma zona fueron vistos dos ejemplares y un nido el 7-III-1992, un ejemplar el 10-X-1992 y un nido el 4-I-1993. La especie fue citada para las zonas bajoserrana y periserrana (NORES et al., 1983: 54-55).

Melanopareia maximiliani. Un ejemplar observado el 28-IX-1988 a 1500 m s. n. m., en el Camino de las altas Cumbres. En la Quebrada de los Condoritos fue observado un ejemplar el 14-XI-1991, y en esa zona un ejemplar fue visto el 10-X-1992. Varios ejemplares fueron observados en las cercanías de la Quebrada del Batán el 11-IX-1992 y el 30-IX-1992. En La Pampilla fue visto un ejemplar el 10-X-1992. Posteriormente se observaron en ese sitio dos ejemplares el 13-XI-1992. En proximidades de La Pampilla (Casa del Aguila, Arroyo de Achala, Pampa Redonda) fueron observados un ejemplar el 13-IX-1992, tres ejemplares el 12 y 13-X-1992 y dos ejemplares el 15-XI-1992, en alturas comprendidas entre 1830 y 1940m. Durante 1992 fueron observados en Puerto Pedernera, cinco ejemplares el 1-II, entre ellos un individuo adulto alimentando un pichón, tres ejemplares el 7-III, otros tres el 12-IV y el 15-V, dos ejemplares el 10-IX, cuatro ejemplares el 10-X y otros cuatro el 16-XI. NORES et al. (1983: 60) indican: "llega por las quebradas de los arroyos hasta el comienzo del piso superior". La especie fue registrada en quebradas, arbustales y pastizales rocosos.

Anthus correndera. Fueron vistos dos ejemplares en La Cumbrecita el 22-I-1988. Los días 28 y 29-IX-1988 fue visto un ejemplar en la Quebrada de los Condoritos. Posteriormente se observó un ejemplar en un pastizal-pajonal cerca de un arroyo, próximo al Puesto de Achala, Estancia Las Ensenadas, el 10-XII-1992. Nores et al. (1983:81), señalan: "pastizales halófilos de lagunas, esteros y bañados de la llanura chacopampeña y Laguna de Pocho".

Geothlypis aequinoctialis. Un ejemplar fue observado el 11-IV-1992, en un bosque de **Polylepis australis**, en la Quebrada de los Condoritos. En Puesto Pedernera, en un bosque similar se observó un ejemplar el 16-XI-1992, tres ejemplares el 28-XII-1992 y dos ejemplares el 4-I-1993. NORES et al. (1983: 82) señalan: "observado también una vez en el comienzo de la zona altoserrana".

Myioborus brunniceps. Un ejemplar fue visto en la Quebrada de los Chorrillos el 10-VI-1990. Se observaron varios ejemplares en un bosque de **Polylepis australis**, en la Quebrada de los Condoritos, el 28-XI-1988. El 15-XI-1991 fueron observados tres ejemplares en el mismo sitio. También en dicho lugar, durante 1992, se observaron dos ejemplares el 3-II, un ejemplar el 5-VIII y varios ejemplares el 16-XI. El 17-XI-1992 se vieron varios ejemplares en la Quebrada de los Infiernillos. En Puesto Pedernera, en una quebrada, se observaron un ejemplar el 13-VI-1992, un ejemplar el 10-X-1992, un ejemplar el 16-XI-1992 y un ejemplar el 28-XII-1992. La especie había sido citada por NORES et al. (1983: 82) para las zonas bajaserrana y periserrana.

Pheucticus aureoventris. Fueron observados en la Quebrada de los Condoritos, un ejemplar el 3-II-1992, una pareja el 16-XI-1992 y un ejemplar el 28-XII-1992, en un bosque de **Polylepis australis**, a aproximadamente 1750 m s. n. m., En una quebrada de Puesto Pedernera fue observado un ejemplar el 7-III-1992., otro ejemplar el 16-XI-1992, dos ejemplares el 28-XII-1992 y un ejemplar el 4-I-1993. Una pareja fue observada a aproximadamente 2300 m s. n. m. en Pampa de Achala en enero de 1992, 7 Km a SW de El Cóndor (ROSACHER com. pers.). Fue citada por NORES et al. (1983:88) para la zona bajaserrana y comienzo de la altoserrana.

ESPECIES CON ESCASOS REGISTROS EN LA PROVINCIA DE CORDOBA

Thinocorus orbignyianus. Un ejemplar fue observado el 13-II-1993, alimentándose de semillas de **Mulhenbergia peruvianana**, en la Pampilla. Esta especie fue capturada por J.

DURIONE en 1919 y citada recientemente (MIATELLO et al., 1991) para las proximidades de Chancani, Dpto. Pocho.

Pseudocolopteryx acutipennis. Se observaron en Puesto Pedernera, en arbustales y pajonales de *Cortaderia selloana* cercanos a un arroyo, tres ejemplares el 1-II-1992, dos ejemplares el 7-III-1992, dos ejemplares el 16-XI-1992 y otros dos el 28-XII-1992. PARTRIDGE (1953) lo señala como frecuente en la Estancia Potrero de Garay (Sierras Chicas), y en Puesto Los Sauces (contrafuertes de Sierra Grande, a 1000 m s. n. m.). Posteriormente fue registrada en Río de los Sauces en 1975 (HARO y GUTIERREZ, 1992); NORES et al. (1983: 71) indican: "registrado solamente en Embalse, Río de los Sauces y El Durazno", zonas bajaserrana y periserrana.

Muscisaxicola maculirostris. Fue observado un ejemplar en Puesto Pedernera el 28-VIII-1992, y otro en la misma zona el 10-IX-1992. En ambas ocasiones se desplazaba recorriendo céspedes junto a una bandada de *Muscisaxicola rufivertex*. Esta especie sólo había sido observada en San Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte (NORES e YZURIETA, 1979), y entre Copina El Cóndor (NORES e YZURIETA, 1986: 50).

Anthus hellmayri. Fue observado un ejemplar el 2-XII-1988, en Pampa de Achala, 20 Km al norte del Camino de las altas Cumbres, cerca del colegio Padre Liqueno. En Los Gigantes fue observado un ejemplar el 26-I-1989 y posteriormente en esta zona se vieron diecisiete ejemplares el 15-IV-1989. Fue visto un ejemplar en Copina el 15-IX-1989. En Puesto Pedernera fueron observados durante 1992, un ejemplar el 7-III, otro ejemplar el 12-IV, tres ejemplares el 10-X, tres ejemplares el 16-XI, tres ejemplares el 28-XII y cuatro ejemplares el 4-I-1993. En las proximidades de La Pampilla fueron observados un ejemplar el 13-X-1992, dos ejemplares el 17-XI-1992, un ejemplar el 11-XII-1992, obteniéndose registros acústicos. En la Quebrada de los Condoritos fueron observados un ejemplar el 14-I-1989 y un ejemplar el 17-XI-1992. Si bien la especie fue citada por PARTRIDGE (1953:66), en la región del Río Corralejos, fue citada por OLROG (1979) para Catamarca y La Rioja, y no se halla incluida en la lista de NORES et al. (1983).

Pospiza hypochondria. Durante 1992 se observaron, generalmente en arbustales de *Heterothalamus alienus* y *Collaea argentina*, en Puesto Pedernera, dos ejemplares el 15-V, veinticinco ejemplares formando una bandada el 28-VIII, tres ejemplares el 10-X, dos ejemplares el 28-XII, y dos ejemplares el 4-I-1993. En la Quebrada de los Condoritos, también en arbustales, un ejemplar fue visto el 16-XI-1992. La especie fue citada para Jujuy y Salta hasta Mendoza por OLROG (1979), para San Luis (NORES e YZURIETA, 1981), y para Córdoba por NORES e YZURIETA (1986: 51), quienes observaron un grupo de unos 8-10 individuos, 7 Km al SW de Copina, el 4-IX-1981.

ESPECIE DE LA QUE SE ACLARA SU CONDICION DE PERMANENCIA

Anairetes parulus. Fue visto un ejemplar en San Clemente, del 9 al 11-V-1989; un ejemplar en Cuesta Blanca del 26 al 28-IX-1989; un ejemplar en la Quebrada de los Chorrillos, próxima a Tanti, en un bosque de orco-quebrachos (*Schinopsis haenckeana*) el 10-VI-1990. En la Quebrada de los Condoritos, en un bosque de *Polylepis australis*, fueron vistos varios ejemplares el 28-VIII-1988, un ejemplar el 14-I-1989, dos ejemplares el 5-VII-1992 y otros dos ejemplares en la Quebrada de la Loma de las Coloradas el 13-VI-1993. El 12-IX-1992 fueron

observados dos ejemplares cazando al vuelo desde desde una "percha", en un pequeño bosque de *Polylepis australis*, en la Quebrada de los Infiernillos. En Puesto Pedernera, en un bosque de *Polylepis australis* fueron observados tres ejemplares el 28-VIII-1992, tres ejemplares el 10-IX-1992, un ejemplar el el 16-XI-1992 y un ejemplar el 28-XII-1992. Esta especie fue dada como presente de setiembre a enero en el piso superior de las Sierras por NORES *et al.* (1983: 72) y NAVAS y BO (1991: 146). Según los datos obtenidos se trataría de una especie permanente.

AGRADECIMIENTOS

A Guillermo OLMOS y Conrado ROSACHER por aportar datos sobre algunas de las especies, a Carlos VIRASORO y Julio R. CONTRERAS por la provisión de bibliografía, a Raquel CERVANTES, Alejandro GIRAUDO y Rodolfo MIATELLO por su colaboración en la elaboración de este trabajo.

BIBLIOGRAFIA

- FRENZEL, J. 1981. Vebersicht über die in der Provinz Córdoba (Argentinien) vorkommen den Vögel. *J. F. Orn*, **19**: 113-126.
- HARO, J. G y M. GUTIERREZ. 1992. La avifauna de una forestación de pinos en el Rfo de los Sauces, Córdoba. *Hornero*, **13**: 214-218.
- MIATELLO, R.; V. COBOS y C. ROSACHER. 1991. Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la Provincia de Córdoba, República Argentina. *Hist. Nat.*, **8** (1): 1-5
- NAVAS, J. R. y N. A. BO. 1991. La Distribución Geográfica de las Razas Australes de *Anairetes parulus* en la Argentina (Aves, Tyrannidae). *Neotrópica*, **37** (98): 145-149.
- NORES, M. D. 1986. Diez nuevas subespecies de aves provenientes de islas ecológicas argentinas. *Hornero*, **12**: 262-273.
- NORES, M. y D. YZURIETA. 1979. Aves de costas marianas y de ambientes continentales, nuevas para la Provincia de Córdoba. *Hornero*, **12**: 45-52.
- NORES, M. D. y D. YZURIETA. 1981. Nuevas localidades para aves argentinas. *Hist. Nat.*, **2**: 101-104.
- NORES, M. D. y D. YZURIETA. 1983. Especiación en las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis (Argentina), con descripción de siete nuevas subespecies de aves. *Hornero*, N^o. Extr. Pp. 88-102.
- NORES, M. D.; D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y Distribución de las Aves de Córdoba, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Cienc. Cba.*, **56**: 1-114.
- NORES, M. D. y D. YZURIETA. 1986. Nuevas localidades para aves argentinas. VII. *Hist. Nat.*, **6** (10): 49-52.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva Lista de la Avifauna Argentina. *Opera Lilloana*, **27**: 1-324.
- PARTRIDGE, W. H. 1953. Observaciones sobre las Aves de las Provincias de Córdoba y San Luis. *Hornero*, **10** (1): 23-73.
- STEMPELMANN, H y F. SCHULZ. 1890. Enumeración de las aves de la Provincia de Córdoba. *Bol. Acad. Nac. Cienc. Cba.*, **10**: 393-438.

NOTULAS FAUNISTICAS

Boletín de Ciencias Naturales de aparición no periódica
Editor Responsable: Julio Rafael CONTRERAS
Casilla de Correo 26, 3400 Corrientes, ARGENTINA.