

NOTULAS FAUNISTICAS

ISSN-0327-0017

- 1993 -

Nº 50

ALGUNAS ESPECIES DE AVES NUEVAS O CON POCOS REGISTROS PARA LA PROVINCIA DE CORDOBA, REPUBLICA ARGENTINA

Rodolfo MIATELLO (1), Conrado ROSACHER (1) y Victor COBOS (2).

SOME NEW OR SCARCELY REGISTERED SPECIES OF BIRDS FROM THE PROVINCE OF CORDOBA, REPUBLICA ARGENTINA

SUMMARY:

The known range of 27 species of birds are extended from many localities of the Province of Córdoba, Argentina. Some comments for those interesting species of the avifauna of the Province, mainly on their habitat and ecology, are given.

En este trabajo se amplía la distribución conocida de veintisiete especies de aves que son escasas o que pocas veces han sido citadas para la Provincia de Córdoba, contribuyéndose de esta forma a su conocimiento y al de los ambientes en los que se desenvuelven en la Provincia.

Los datos que se aportan sobre las especies, sobre todo respecto a Accipitridae, son el resultado de muchas horas acumuladas de observación, por ejemplo, la cita de *Harpyhaliaëtus* del 2 al 8.II.87, se obtuvo observando a dichas águilas poco más de seis horas.

A menudo se mencionan las Zonas Ornitogeográficas de la Provincia de Córdoba: son las que figuran en NORES *et al.* (1983) y la cita de los ambientes fitogeográficos de la misma, corresponde a LUTI *et al.* (1979).

Los resultados que aquí se presentan forman parte de las tareas de relevamiento de la avifauna que se realiza en los Parques y Reservas Provinciales de la Provincia de Córdoba, así como en otras áreas de interés dentro de la misma. Dichas tareas cuentan con el apoyo de la Dirección de Areas Naturales, dependiente de la Secretaría Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de la Provincia y de la Organización No Gubernamental, F. U. C. E. M. A. (Fundación para la Conservación de las Especies Animales y del Medio Ambiente).

Las especies que se considera de interés dar a conocer son las siguientes: *Crypturellus tataupa*, *Syrigma sibilatrix*, *Botaurus pinnatus*, *Theristicus melanopis*, *Anas specularis*.

(1) Técnico de la Dirección de Areas Naturales Protegidas, Avda. del Dante y La Coruña, 5000 Córdoba, ARGENTINA.

(2) Ciudad de Tampa 2853, Villa Cabrera, 5009, Córdoba, ARGENTINA.

NOTULAS FAUNISTICAS	Nº 50	1993	Pp. 1-12	CORRIENTES, ARGENTINA
---------------------	-------	------	----------	-----------------------

Buteogallus urubitinga, *Accipiter striatus*, *Accipiter bicolor*, *Buteo albicaudatus*, *Geranoaëtus melanoleucus australis*, *Harpyhaliaëtus coronatus*, *Ortalis canicollis*, *Cariama cristata*, *Oreopholus ruficollis ruficollis*, *Tringa solitaria*, *Thinocorus orbignyianus*, *Sapphosparganura*, *Heliomaster furcifer*, *Dryocopus schulzi*, *Taraba major*, *Melanopareia maximiliani pallida*, *Muscisaxicola alpina*, *Muscisaxicola maculirostris*, *Fluvicola pica*, *Sturnella loyca loyca*, *Volatinia jacarina*, y *Poospiza hypochondria*.

1.- *Crypturellus tataupa tataupa* (TEMMINCK, 1815)

Esta especie habita todo el norte y el oeste provincial, en los ambientes de bosque chaqueño de llanura (Chaco Oriental y Occidental) y de bosque serrano (Chaco Serrano), subiendo por los faldeos de las Sierras Chicas hasta alturas comprendidas entre los 900-1000 metros. En los bosques degradados tanto de llanura como serranos también está presente y suele ser abundante. Tal vez el ambiente de "fachinal" la beneficie disminuyéndole la predación. Fue observada en Las Toscas, Departamento Ischilín, los días 3 al 9.II.87 dos ejemplares. Del 8 al 9.VII.87, dos ejemplares. Los días 20 y 21.XI.87, tres ejemplares. Del 20 al 23.XII.87, tres ejemplares. En las proximidades de Quilino, Departamento Ischilín, los días 4 y 5.IX.93, fueron vistos y oídos cinco ejemplares. El 20.X.93, dos ejemplares. En Guanaco Muerto, Departamento Cruz del Eje, en bosque chaqueño occidental, próximo a cursos de agua temporarios, el 11.XI.86, un ejemplar con nido; y el 27.III.88, tres ejemplares. En Pinas, Departamento Minas, el 11.VI.86, se escucharon tres ejemplares. En Chancaní, Departamento Pocho, del 3 al 9.III.86; el 28 y 29.VII.88 y el 16.I.86 fueron vistos y oídos tres ejemplares. Del 15 al 18.III.93, fueron vistos y oídos, cinco ejemplares. En Quebrada del Tigre, Departamento San Alberto, el 16.XII.91, dos ejemplares oídos y uno visto. Observada próxima a la costa oeste de la Laguna Mar Chiquita, Departamento Río Primero, del 12 al 15.X.88, dos ejemplares. En Puesto de Castro, Departamento Río Seco, del 6 al 7.IX.86, dos ejemplares y el 23.VII.90, tres ejemplares. Al Norte de la Laguna Mar Chiquita, en Los Pozos, Departamento Tulumba, el 27.VII.92, dos ejemplares. Próximo a Colonia 10 de Julio, Departamento San Justo, del 23 al 24.X.85, fue visto un ejemplar y oídos otros tres, generalmente en isletas de bosque chaqueño con sotobosque denso. La especie había sido citada por NORES et al. (1983) para la región central del norte de la Provincia, aproximadamente entre los 63° y 64° de longitud oeste.

2.- *Syrigma sibilatrix sibilatrix* (TEMMINCK, 1824)

Es una especie que hasta los años 1980-1981, tenía una distribución provincial que se limitaba al este cordobés, hasta la altura del Río Saladillo (33° 30' de latitud sur) NORES et al. (1983). Pero, progresivamente fue colonizando territorios del sur y del sudeste y luego se expandió hacia el oeste subiendo a los faldeos orientales de las Sierras Chicas hasta los 1000 metros en el ambiente del Chaco Serrano. Seguramente la década lluviosa acaecida en la zona central de la Argentina a partir de 1982, sumada a la modificación de los ambientes locales, con la combinación de campos cultivados, pasturas y altas arboledas de especies introducidas (*Eucalyptus*, *Cupressus*, *Pinus*), a las que utiliza esta garza para dormir y nidificar, han ayudado a esa expansión de la especie.

Se la observó en el arroyo Tegua, próximo a Hernando, Departamento Tercero Arriba, el 22 y 23.X.86, tres ejemplares. En el arroyo Chucul, próximo a Uacha, Departamento Juárez Celman, del 8 al 10.XI.91, cinco ejemplares y del 28 al 30.IV.92, cinco ejemplares. En Alejandro, Departamento Juárez Celman, el 18 y 19.V.93, cincuenta individuos. En Del Campillo, Departamento Gral. Roca, el 21.XI.92, tres ejemplares. En Laguna La Chanchera,

próxima a Laboulaye, el 1 y 2.V.93, cinco ejemplares. En Rfo de los Sauces, 10 Km. al oeste, Departamento Calamuchita, el 13.V.85, dos ejemplares. En el Cerro Pan de Azúcar, el 20.IX.92, dos ejemplares y el 18.IV.93, tres ejemplares. y en Las Ensenadas, faldeos del Pan de Azúcar, Departamento Colón, el 20.IX.93, dos ejemplares y el 22.X.93, otros dos ejemplares. En San Nicolás, Departamento Santa María, el 18.V.92, cuatro ejemplares. En las proximidades de Canals, Departamento Unión, los días 7 y 8.XII.81, tres ejemplares.

3.- *Botaurus pinnatus pinnatus* (WAGLER, 1829)

Esta especie fué observada en un denso totoral (*Typha* sp.) en el sistema de lagunas que forma el arroyo Chucul, próximo a Villa Reducción, Departamento Juárez Celman, el 24 y el 25.V.93, donde un ejemplar fue escuchado varias veces y luego observado. La especie fue vista pocas veces en la Provincia (ZOTTA, 1935-1941). OLROG (1959) la cita como una especie de presencia permanente. MIATELLO et al. (1991) la dan a conocer para el Departamento San Justo y para el Departamento Unión. Posiblemente la ya mencionada década lluviosa que se experimentó en esta zona central de la Argentina diera lugar a la expansión de la especie (al menos temporariamente).

4.- *Theristicus melanopis melanopis* (GMELIN, 1789)

Esta bandurria fue vista en varias oportunidades en el este y en el noroeste de la Provincia. OLROG (1979) la cita como migratoria. NORES et al. (1983) la citan como visitante de invierno desde el sur Argentino hasta los 33° de latitud sur. Fue observada en Colonia 10 de Julio, Departamento San Justo, en el mes VII.89, cuando se vieron 20 ejemplares. En Las Varillas, Departamento San Justo, el 25 y 26.V.85, 28 ejemplares. En Los Pozos, Departamento Tulumba, el 27.VII.91, 15 ejemplares, estas tres últimas citas corresponden a los pastizales de la margen derecha del Río Dulce, hacia el oeste. De ésta forma se amplía hacia el norte su área conocida de distribución cordobesa llegando hasta los 30° de latitud sur, aproximadamente.

5.- *Anas specularis* (KING, 1828)

Este pato ha sido visto en Córdoba en sólo dos oportunidades en los últimos veinte años. Tratándose de una especie que frecuenta lagunas abiertas, salobres y que resulta fácil de identificar, la falta de información existente denota que sólo debe llegar en forma muy ocasional. Fue observada próxima a la localidad de Los Cisnes, Departamento Juárez Celman, el 22.V.85, donde había dos ejemplares nadando junto a 25 a 30 *Anas platalea* y a un centenar de *Podiceps occipitalis*. Fue observado también en una laguna del sistema del arroyo Chucul, próxima a la localidad de Bengolea, Departamento Juárez Celman, el 26.V.93, donde había un ejemplar nadando junto a más de diez *Anas sibilatrix*, cuatro *Anas platalea* y un grupo de cerca de 200 *Podiceps occipitalis* (éste último es el grupo más grande de esta especie visto por los autores en la Provincia).

6.- *Buteogallus urubitinga urubitinga* (GMELIN, 1788)

A esta especie no se la veía desde muchos años atrás en la Provincia. Actualmente se la ha registrado hasta los 64° 00' W y 31° 15' S, aproximadamente, viéndosela con cierta frecuencia en el noreste provincial. Es un águila numericamente escasa, que usa perchas altas (*Eucalyptus*) y, a menudo, árboles secos de las regiones inundadas próximas a la Laguna Mar Chiquita, generalmente cerca del agua, en lagunas, bañados o riachos. Seguramente la década lluviosa ya mencionada ha modificado los ambientes del noreste provincial y está recolonizándolos, expandiendo así, al menos temporariamente, su área de distribución. OLROG (1959) la mapea

en la geonemia de esta especie la región del noroeste cordobés, a la que llegaría en sus migraciones invernales. Fue observada, 15 kilómetros al norte de Villa Fontán, Departamento Río Primero, el 20.VII.88, cuando un ejemplar adulto estaba en un bosquecillo seco de chañares y Algarrobos (*Geoffroea, Prosopis*), junto a un grupo de 15 *Coragyps atratus*. Fue también observada al norte de La Para, Departamento Río Primero, el 1.II.88 cuando un ejemplar adulto estaba en un bosque inundado a orillas de la Laguna Mar Chiquita, junto a tres ejemplares de *Polyborus plancus*. Observada otra vez 10 kilómetros al norte de Brinkmann, Departamento San Justo, el 24.II.91, donde se avistó un ejemplar adulto en un bosque de grandes eucaliptos (*Eucalyptus viminalis*), próximo a un bañado temporario. El cuarto ejemplar fue observado al este de Pozo de la Olla, Departamento Río Seco, el 22.VI.91, en una región árida, posado en un gran quebracho blanco (*Aspidosperma*) a 5 kilómetros de la Laguna de Galán. R. TORRES (com. pers.), la observó en la Laguna Santo Domingo, Departamento Colón.

7.- *Accipiter striatus erythronemius* (KAUP, 1850)

Esta especie habita los bosques chaqueños de llanura del noreste, norte y oeste de la Provincia (Chaco Oriental, Chaco Occidental); las Sierras Chicas y las Sierras Grandes hasta los 2000 metros de altura, como así también la zona periserrana y algunos bosquecillos de la mitad norte de la Provincia (relictos del Espinal) asociados con parches de vegetación exótica. NORES et al. (1983) la citan exclusivamente para la región serrana y periserrana. Algunas de las citas extralimitales son: Colonia 10 de Julio, Departamento San Justo, el 5.II.88, tres ejemplares, y el 23.VIII.85, un ejemplar más. En Brinkmann, Departamento San Justo, el mes VIII.84, dos ejemplares. El mes X.86, tres ejemplares. El mes XI.86, tres ejemplares. El mes XI.89, dos ejemplares. En Los Pozos, Departamento Tulumba, el 24.VII.90, un ejemplar. El mes VII.91, un ejemplar. En Isla Larga, Departamento Tulumba, el 23.VII.90, dos ejemplares. En Pampa de Achala, Departamento Santa María, el mes X.88, dos ejemplares. El mes I.89, dos ejemplares. El mes III.89 dos ejemplares. El 10.I.92, tres ejemplares y el 12 al 20.II.93, un ejemplar. En Pampa de Achala, Departamento San Alberto, el mes III.89, un ejemplar. El IX.91, dos ejemplares y el 19 y 20.II.93 dos ejemplares. En Las Toscas, Departamento Ischilín, el 9.XI.87, tres ejemplares. El mes IV.88, un ejemplar. El 23.XII.86, dos ejemplares. Del 3 al 9.II.87, tres ejemplares. El 04.IX.92, un ejemplar. Del 4 al 6.IX.93, un ejemplar. Del 9 al 11.X.93, un ejemplar. El 20.X.93, un ejemplar. En Guanaco Muerto, Departamento Cruz del Eje, el 8.IV.81, dos ejemplares. El 11.V.81, dos ejemplares. Del 19 al 20.X.88, un ejemplar. En Cruz del Eje, Departamento del Eje, el 18.V.81, un ejemplar. El 15.I.83, tres ejemplares. En Chancaní, Departamento Pocho, el 8 y 9.XII.85, un ejemplar. Del 1 al 6.III.86, tres ejemplares. Del 5 al 8.V.86, tres ejemplares. Del 13 al 16.XII.91, tres ejemplares. Del 11 al 18.III.93, cinco ejemplares.

8.- *Accipiter bicolor chilensis* (PHILIPPI y LANDBECK, 1864)

Esta subespecie ha sido observada en dos oportunidades en el noroeste de la Provincia. Aparentemente usa en su ruta de desplazamiento invernal el corredor migratorio del oeste de las sierras. Este gran gavilán frecuenta isletas de bosque chaqueño de llanura (de 8 a 12 m de altura) con predominio de *Aspidosperma*, y *Prosopis*, las que alternan con estepas de pastizales y jarillares. Fue observada al oeste de la localidad de Las Toscas, en el Departamento Ischilín, el 9.VII.87, cuando se vieron cinco ejemplares, uno adulto y cuatro juveniles. Observada también próxima a la localidad de El Chacho, Departamento Minas, el 23.V.92, donde se registraron cuatro ejemplares, un macho adulto y tres juveniles.

9.- *Buteo albicaudatus albicaudatus* (VIEILLOT, 1816)

A esta especie se la ve, por lo común en todo el territorio provincial. Es un águila numéricamente escasa. La población de las sierras es medianamente estable; en las llanuras es más abundante en otoño e invierno, seguramente por la llegada de ejemplares migrantes del sur argentino que pasan el invierno en estas regiones con clima más benigno. Es común ver en el llano el morfo con plumaje oscuro. Llega en pequeños grupos de hasta diez individuos, utiliza perchas tales como postes de telégrafo o torres de alta tensión. En las sierras se posa en rocas, generalmente en paredes escarpadas. La especie había sido citada por NORES et al. (1983) para la mitad norte de la Provincia, al este de las Sierras Grandes, incluyéndolas. Las citas extralimitales son: Las Toscas, Departamento Ischilín, el 9.V.87, un ejemplar. el 18.VIII.88, dos ejemplares. En Serrezuela, Departamento Cruz del Eje, el 10.XII.88, un ejemplar. En Guanaco Muerto, Departamento Cruz del Eje, los días 28 y 29.VII.87, un ejemplar. En Laborde, Departamento Unión, los días 1 al 7.X.81, dos ejemplares. En Laboulaye, Departamento Roque Saenz Peña, el 9.IV.85, cinco ejemplares. El 20.V.93, dos ejemplares. En Villa Huidobro, Departamento General Roca en el mes IV.85, dos ejemplares. En Alejandro, Departamento Juárez Celman, el 22 y 23.X.86, tres ejemplares.

10.- *Geranoaëtus melanoleucus australis* (SWANN, 1922)

Esta raza de Águila Mora se encuentra distribuída en todo el territorio provincial y es una subespecie numéricamente escasa. En la llanura se la ve con más frecuencia en otoño-invierno; en las sierras se ven adultos y ejemplares juveniles todo el año. Esta raza sureña es notablemente mayor que la típica, a la cual duplica en peso. Tiene un vuelo más pesado que aquélla. En las sierras gusta posarse en laderas rocosas (con poca vegetación). En el llano usa perchas a poca altura del suelo: un cardón, un quebracho o un viejo algarrobo. Suele posar de 2 a 3 metros del suelo, a veces en el poste de algún alambrado. Su silueta resalta como la de un gran vigía, comportamiento que casi no realiza *Harpyaliaëtus*, que se mimetiza de espaldas con la vegetación de una barranca o dentro de la copa de un gran quebracho blanco o algarrobo. Las nuevas citas son: La Rinconada, Departamento Río Seco, los días 25 y 26.VII.90, un ejemplar. En Isla Larga, Departamento Tulumba, el 12.VII.91, un ejemplar adulto. En Cañada Honda, Departamento Tulumba, el 24.VII.92, un ejemplar adulto. En Los Pozos, Departamento Tulumba, el 24.VII.90, un ejemplar adulto. En Palos Secos, Departamento Sobremonte, el 16.IV.92, un ejemplar adulto. En San José de las Salinas, Departamento Tulumba, el 6 y 7.X.88, un ejemplar adulto. En Las Toscas, Departamento Ischilín, el mes IV.88, dos ejemplares adultos. El 9.V.87, un ejemplar subadulto. En Guanaco Muerto, Departamento Cruz del Eje, el mes VIII.88, un ejemplar subadulto. En Balde de la Orilla, Departamento Pocho, los días 28 y 29.VII.88, un ejemplar adulto.

En Pampa de Achala, en el mes IV.88, se vió un ejemplar adulto. En el mes III.89, se vió un ejemplar adulto. El mes IV.89, se registró un ejemplar subadulto. En el mes IV.90, otro ejemplar subadulto. En el mes II.91, un ejemplar adulto. En el mes I.92, se vió un ejemplar subadulto y el mes III.91, otro ejemplar subadulto.

11.- *Harpyhaliaëtus coronatus* (VIEILLOT, 1817)

Esta especie ha sido vista en la llanura boscosa del norte y oeste de la Provincia y en los bosques serranos hasta los 1500 metros, o sea en los ambientes forestales de tipo Chaqueño Occidental y del Chaco Serrano, siempre en regiones deshabitadas y con arboledas altas y densas. Es un águila escasa y con costumbres crepusculares; a medio día o está volando a gran

altura (lo que dificulta su identificación) o se encuentra escondida en el follaje de un gran árbol. En el bosque bajo compensa la falta de árboles altos posándose, generalmente, en árboles que están a orillas de barrancas o de laderas escarpadas de las sierras. Fue observada en: la Estación Gutenberg, en el Departamento Río Seco, donde el 12.IX.92, se vió un ejemplar. En San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, el 24.IV.92 se vió un ejemplar adulto. En Cerro Colorado, Departamento Tulumba, el 20.IX.85, se observó un ejemplar adulto. En Las Toscas, Departamento Ischilín, del 26 al 30.VIII.82, se observó un ejemplar adulto. Los días 19 al 23.IX.82, se vieron dos ejemplares adultos. Entre el 3 y el mes 8.II.87, se observaron tres ejemplares jóvenes. El 9.VII.87, se vió un ejemplar adulto. En el mes VIII.88, se vió un ejemplar adulto. En Chancaní, Departamento Pocho, el 2.III.87, se observaron tres ejemplares jóvenes. Del día 25 al 29.VII.88, se vieron tres ejemplares jóvenes y un adulto. En El Durazno, Departamento Punilla, el 21.II.85, se vió un ejemplar joven. En Tanti, Departamento, Punilla, el 22.II.85, se observó un ejemplar joven. En Copina, Departamento Punilla, el 30.IX.79, se observó un ejemplar joven y los días 9 y 10.V.81, se observó un ejemplar adulto. En Cuesta Blanca, Departamento Punilla, del 12 al 15.XI.80, se registraron dos ejemplares jóvenes. Del 13 al 20.VII.80, se registraron un ejemplar joven y dos adultos. El 18 y el 19.IV.81, se vieron dos ejemplares adultos. Entre el 11 y el 14.VI.81, se vieron dos ejemplares adultos. El 19 y 20.VI.81, se observaron dos ejemplares adultos y un ejemplar joven. En Río Ceballos, Departamento Colón, el 27.IX.85, se observó un ejemplar joven. En San Clemente, Departamento Santa María, el 15.I.92, se vieron dos ejemplares jóvenes.

12.- *Ortalis canicollis canicollis* (WAGLER, 1830)

Esta especie habita los bosques del norte de la Provincia. Se la encuentra en las Sierras del Norte (Chaco Serrano) y en la llanura boscosa (Chaco Oriental). Aparece con frecuencia en los bosques más umbríos y en las quebradas de las sierras. En general es vista en grupos de cuatro, ocho, doce y dieciseis ejemplares (tal vez un grupo familiar esté compuesto de cuatro ejemplares). Fueron observados en Gutenberg, Departamento Río Seco, el 2.IX.92, donde se observaron ocho ejemplares. En Candelaria Norte, Departamento Río Seco, los días 11 y 12.IV.92, se observaron cuatro ejemplares. En Los Hoyos, Departamento Río Seco, el 13.IV.92, se vieron 16 ejemplares. En Las Islas, Departamento Sobremonte, el 14.IV.92, se registraron cuatro ejemplares. En las proximidades de Rosario del Saladillo, Departamento Tulumba, cuatro ejemplares. En Chalacea, Departamento Río Primero, el 21 y 22.VII.90, se vieron cuatro ejemplares. En Las Peñas, Departamento Totoral, el 21.XII.92, se observaron seis ejemplares. NORES et al. (1983) la citan muy puntualmente para una pequeña área de las Sierras del Norte.

13.- *Cariama cristata* (LINNE, 1766)

Esta especie habita montes y bosques de la zona periserrana, bajo serrana y altoserrana hasta los 2000 m de altura; también las sierras del norte y las pampas con palmares. Es una especie escasa, Fueron observados en las proximidades de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, del 14 al 16.IV.92, dos ejemplares. En Pozo de las Palomas, Departamento Tulumba, el 22.VII.88, otros dos ejemplares. En Aguas de Ramón, Departamento Minas, del 21 al 22.II.92, se vió un ejemplar. En Las Playas, Departamento Minas, el 23 y 24.II.92, fueron observados dos ejemplares. En la localidad de Alto de los Talas, Departamento Pocho, el 13 y 14.XII.91, se vieron dos ejemplares. Fue observado en La Paz, Departamento San Javier, el 11.XII.91, un ejemplar. En Ambul, Departamento San Alberto, el 26.II.92, se observó un ejemplar. En San Clemente (Las Petacas) Departamento Santa María, el 14 y el 15.I.92, se

vieron dos ejemplares. En Sierras Grandes, Departamento San Alberto, a 1900 m. s. n. m., el 7.X.93, fueron registrados dos ejemplares. En las sierras, 15 kilómetros al oeste de la localidad de Cuesta Blanca, Departamento Punilla, del 13 al 20.VII.80, se vio un ejemplar y del 11 al 14.VI.81, dos ejemplares adicionales. En las proximidades de Cerro Hermoso, Departamento San Alberto, el 25.VIII.91, fueron registrados dos ejemplares.

14.- *Oreopholus ruficollis ruficollis* (WAGLER, 1829)

Esta especie posiblemente tenga dos razas en la Provincia, una que vive en forma permanente en Sierras Grandes y Pampa de Achala y se la encuentra en bandaditas de ocho a veinte ejemplares (grupos chicos) y bastante fieles a un territorio. La raza típica es migratoria del sur argentino y aparece en la Provincia en otoño e invierno en grupos grandes, compuesto de 70 a 200 ejemplares. Ha sido observada en Brinkmann, Departamento San Justo, el 10.IV.88, registrándose 180 ejemplares; posteriormente el 10.VII.89, 150 ejemplares. En Las Varillas, Departamento San Justo, el 10.IV.85, se vieron 120 ejemplares. En las proximidades de Morteros, Departamento San Justo, el 10.VIII.84, se vieron unos 70 ejemplares. En Suardi, Departamento San Justo, el 18.VII.88, se observaron unos 90 a 100 ejemplares. NORES et al. (1983), la citan para el sudeste de la Provincia hasta los 32° 45' de latitud sur. De ésta forma se amplía su distribución hasta los 30° 30' de latitud meridional en el noreste provincial.

15.- *Tringa solitaria solitaria* (WILSON, 1813)

Esta especie fue vista en el norte y en el oeste de la Provincia, a orillas de arroyos que desembocan en las Salinas Grandes. También en lagunas y represas, siempre en cuerpos de agua con arboledas contiguas. NORES et al. (1983) citan a esta especie para el noreste de la Provincia de Córdoba. Las nuevas citas son: Las Toscas, Departamento Ischilín, del 21 al 24.XII.86, un ejemplar y del 3 al 9.II.87, otro ejemplar. En Las Ollas, Departamento Cruz del Eje, el 9.II.87, un ejemplar. En Chacabán, Departamento Pocho, del 8 al 9.XII.85, un ejemplar.

16.- *Thinocorus orbignyianus orbignyianus* (LESSON, 1831)

Esta especie fue vista pocas veces en la Provincia en el siglo que corre (MIATELLO et al., 1991; BALDO y ORDANO, 1993). Fue observada en pastizales de altura, entre los 1800 y 2000 metros de altitud, siempre en las proximidades de algún arroyo: en el Departamento San Alberto, donde varios individuos solitarios, fueron vistos en cinco oportunidades, durante los días 12 al 20.II.93.

17.- *Sappho sparganura sappho* (LESSON, 1829)

Esta especie habita la mitad norte de la Provincia, hasta aproximadamente los 32° de latitud sur, observándose en los relictos del Espinal del este, en la llanura chaqueña del noreste (Chaco Oriental), próxima a los Bañados del Río Dulce. También en la llanura del norte y del oeste (Chaco Occidental), siendo más abundante en todas las sierras (Chaco Serrano) hasta los 1800-1900 metros de altura, en las quebradas. Es un picaflor que prefiere los ambientes húmedos, las quebradas y la vegetación boscosa alta. Las nuevas citas extralimitales son: Colonia 10 de Julio, Departamento San Justo, del 23 al 29.X.85, donde se vió un ejemplar. En las proximidades de La Para, Departamento Río Primero, el 26.III.85, otro ejemplar. Fueron vistas próximas a Las Varas, Departamento San Justo, el 24.III.85, dos ejemplares. Vista en la localidad de Laguna Larga, Departamento Río Segundo, el 23.III.85, un ejemplar. Vista en los alrededores de Sampacho, Departamento Río Cuarto, los días 19 a 22.VI.87, otro ejemplar.

Vista en Chancaní, Departamento Pocho, el 23.IV.85, dos ejemplares; el 26.II.87, un ejemplar; el 7.V.87, tres ejemplares. Del 25 al 29.VII.88, se vieron seis ejemplares. Vista en la localidad de Los Charcos, Departamento Cruz del Eje, el 27.IV.92, tres ejemplares. Vista en Guanaco Muerto, Departamento Cruz del Eje, del 24 al 29.VII.81. Vista en El Bordo, Departamento Tulumba, el 4.IX.92, dos ejemplares.

18.- *Heliomaster furcifer* (SHAW, 1812)

Esta especie habita la mitad norte de la Provincia hasta aproximadamente los 32° de latitud sur, observándose en los relictos de espinal del este, en la llanura chaqueña del noreste (Chaco Oriental), en la llanura chaqueña del norte y noroeste (Chaco Occidental) y en las sierras (Chaco Serrano) hasta aproximadamente los 1000 metros de elevación. Es un picaflor adaptado a vivir en ambientes secos con vegetación baja. Las citas extralimitales son: vista en Las Toscas, Departamento Ischilín, el 23-24.IX.82, dos ejemplares. Además se observaron el 30.III.88, tres ejemplares; el 20.XII.86, un ejemplar; y del 3 al 9.II.87, se observaron tres ejemplares; otros también en el mes IX.87 y en el mes X.87. El 19-20.X.88, dos ejemplares; y el 19-23.X.89, otros tres ejemplares. Vista en Guanaco Muerto, Departamento Cruz del Eje, el 22 al 24.VII.81, un ejemplar; el 27.III.88, tres ejemplares y el 18 y 19.XII.86, dos ejemplares. Vista en Chancaní, Departamento Pocho, el 8 y 9.XII.85, dos ejemplares. El 3 y 4.III.86, tres ejemplares. El IX.87, dos ejemplares. El 15.XII.91, un ejemplar. Del 11 al 18.III.93, cuatro ejemplares. Vista en La Laguna, Departamento Río Segundo, el 25.V.85, dos ejemplares. Vista en Miramar, Departamento San Justo, el 29.XI.86, un ejemplar; y el 20.V.89, dos ejemplares. Vista en Colonia 10 de Julio, 10 kilómetros al oeste, en el Departamento San Justo, el 2 y el 3.II.88, dos ejemplares y el 24.XI.86, otros tres ejemplares. También vista en los alrededores de Brinkmann, Departamento San Justo, en el mes I.86, cuatro ejemplares; en el mes II.86, un ejemplar; en el mes III.86, dos ejemplares y en el mes VII.86, se observó un ejemplar. En San Antonio, Departamento Cruz del Eje, el 15.XII.80, tres ejemplares.

19.- *Dryocopus schulzi* (CABANIS, 1883)

Esta especie de carpintero habita regiones de bosques de llanura del norte y del oeste de la Provincia (Chaco Oriental y Chaco Occidental) y en los montes serranos y periserranos, llegando en primavera y verano a verse ejemplares hasta los 1500 o los 1600 metros de altura, en las quebradas boscosas de las sierras. Esta especie necesita bosques maduros y posmaduros, pues nidifica en los grandes árboles (*Prosopis*, *Aspidosperma*, *Schinopsis*) y se alimenta en ellos. NORES et al. (1983) la citan para la región serrana y periserrana, por debajo de los 1300 metros. Las citas extralimitales son: Copina, Departamento Punilla, el 15.XII.86, donde se observó un ejemplar. En la Quebrada del Río Malambo, Departamento Punilla, el 18.XII.86, dos ejemplares. En las proximidades de la Quebrada del Condorito, Departamento San Alberto, el 15.I.87, se vieron dos ejemplares. Visto además en la llanura chaqueña occidental en Chancaní, Departamento Pocho, del 5 al 8.V.86, dos ejemplares; el 22.V.86, dos ejemplares; el 11.VI.86, dos ejemplares; el 28.VII.87, un ejemplar; en el mes IX.87, dos ejemplares; el 25 y 28.VII.88, cuatro ejemplares; el 15.XII.91, un ejemplar; y del 11 al 18.III.93, tres ejemplares. En Pinas, Departamento Minas, el 11.VI.86, se vieron dos ejemplares. En Los Leones, Departamento Cruz del Eje, el 9.VII.87, se vió un ejemplar. En Guanaco Muerto, Departamento Cruz del Eje, el 18.XII.86, dos ejemplares. En la Quebrada Calado, Departamento Cruz del Eje, el 26.IV.92, un ejemplar. Visto en la llanura chaqueña oriental, en Villa Candelaria, Departamento Río Seco, el 16.IX.85, dos ejemplares. En Candelaria Norte, Departamento Río Seco, el

12.IV.92, un ejemplar. Próximo a la Colonia 10 de Julio, Departamento San Justo, el 24.XI.86, fue observado un ejemplar. En Palos Secos, Departamento Sobremonte, el 16.IV.92, un ejemplar. En el Bajo Alegre, Departamento Sobremonte, se registraron dos ejemplares el 16.IV.92; y un ejemplar el 16.IV.1992.

20.- *Taraba major major* (VIEILLOT, 1816)

Esta especie se distribuye en la mitad norte de la Provincia. NORES et al. (1983) la citan para la región del noreste. Las nuevas citas extralimitales son: Las Toscas (Monte de las Barrancas), Departamento Ischilín, los días 20 y 22.XI.87, dos ejemplares y el mes VIII.88, otros dos ejemplares. Vista también en Chancaní, Departamento Pocho, el 25-29.VII.88, dos ejemplares; del 13 al 16.XII.91, dos ejemplares y del 11 al 18.III.93, otros cinco ejemplares. Vista en La Quebrada, Departamento Colón, el 05.IX.85, dos ejemplares y el 13.IX.85, otros dos ejemplares. Vista en Río Ceballos, Departamento Colón, el 27.IX.85, dos ejemplares y el 12.III.86, tres ejemplares. Vista en Las Ensenadas, Departamento Colón, el 26.III.86, dos ejemplares; el 4.IV.86, dos ejemplares; el 26-27.II.86, tres ejemplares y el 10.X.86, dos ejemplares y el 28.X.86, un ejemplar. Vista en La Lagunilla, Departamento Santa María, el 08.I.85, un ejemplar. Vista en la localidad de La Laguna, Departamento Río Segundo el 25.V.85, dos ejemplares. Vista en La Calera, Departamento Colón, el 30.IV.85, dos ejemplares. Observada en forma permanente en las localidades de Saldán, Villa Allende y en Córdoba, Departamento Capital, donde ha sido registrada en otoño e invierno. Es una especie que gusta de los sectores húmedos, próximos a arroyos y cañadas húmedas dentro del bosque chaqueño serrano, llegando aproximadamente a los 1000 m de altitud. También está presente en las zonas húmedas del ambiente bajoserrano.

21.- *Melanopareia maximiliani pallida* NORES e YZURIETA, 1980

Esta forma de Gallito de Collar habita terrenos arbustivos secos del norte y oeste de la Provincia y en arbustales halófilos próximos a las salinas. NORES et al. (1983) la citan para el noreste de la Provincia. Fue observada por los autores en Obispo Trejo, Departamento Río Primero, el 20.XII.92, un ejemplar. En la localidad de Palos Secos, Departamento Sobremonte, el 15.IV.92, fueron oídos dos ejemplares. En San José de las Salinas, Departamento Tulumba, el 6.X.88, fueron oídos otros dos ejemplares. En Las Toscas, Departamento Ischilín, el 8.VII.87, se vió un ejemplar y el 30.III.88 se vieron y escucharon dos más. El 20.X.88 se observó un ejemplar. Entre los días 19 y 23.X.89 fueron oídos y vistos tres ejemplares en la misma localidad. En las proximidades de Piedrita Pintada, Departamento Minas, el 17.XII.91, fueron oídos y vistos otros dos ejemplares. En Chancaní, Departamento Pocho, el 28.VII.87, fue visto un ejemplar, del 1 al 10.III.86, se registró un ejemplar y fueron oídos otros dos.

22.- *Muscisaxicola alpina* ssp.

Es una especie que ha sido observada en un camino de tierra que une la localidad de Las Cañas, Departamento Ischilín, con San José de las Salinas, Departamento Tulumba, a orillas de las Salinas Grandes, en una estepa de pastos salados, jumes, cachiyuyos, palo azul y bosquesillos aislados de chañares. Entre el 8 y el 14.IV.93, se vieron unos 40 ejemplares que se desplazaban haciendo cortos vuelos y corrían a lo largo del camino. Por momentos se separaban en pequeños grupos de cinco a diez individuos. Alguno de ellos intentó posarse a baja altura en unos chañares, pero sólo lo hizo por pocos segundos. Posiblemente se trata de la raza *cinerea* durante su migración invernal. (OLROG, 1959, 1963, 1979) la cita para la Provincia de Mendoza y

menciona una migración sur-norte. Tal vez dicha migración se comporte en forma semejante a la de otras especies que ingresan a la Provincia de sudoeste a noreste (bajando en altitud y latitud).

23.- *Muscisaxicola maculirostris maculirostris* (D'ORBIGNY y LAFRESNAYE, 1837)
Esta especie ha sido citada pocas veces para la Provincia. NORES et al. (1983) la citan por primera vez. Una segunda observación para las sierras de Córdoba corresponde a BALDO y ORDANO (1993).

Observada a orillas del Río Pintos, Departamento Cruz del Eje, el 15.I.83, un ejemplar. En un arenal próximo al Río La Suela, Departamento Punilla, el 28.IV.87, se vió un ejemplar. En Piedrita Blanca, Departamento Minas, el 17 y 18.XII.91, se observó un ejemplar en un camino de tierra rodeado de un arbustal seco y con suelo pedregoso. En la localidad de La Paz, Departamento San Javier, en la falda occidental del Cerro Champaquí, en una ladera pedregosa con arbustos ralos, el 26.V.92, se registró un ejemplar.

24.- *Fluvicola pica albiventer* (SPIX, 1825)

A esta especie se la ve en la mitad norte de la Provincia. NORES et al. (1983) la citan para la región del noreste (Baños del Río Dulce y desembocadura de ríos Primero y Segundo, en la Laguna Mar Chiquita). Las nuevas citas extralimitales son: avistada en el Río Los Tártagos, en Cerro Colorado, Departamento Tulumba, un ejemplar, el 26 y el 27.XI.84. Vista también en las orillas de un arroyo que desemboca en las Salinas Grandes, localidad de Las Toscas, Departamento Ischilín, un ejemplar, el 23.XII.86. Observada en las orillas de un riacho, cerca de la localidad de Las Ollas, Departamento Cruz del Eje, un ejemplar, el 9.II.87. Vista en una aguada en Guanaco Muerto, Departamento Cruz del Eje, un ejemplar, el 21.IV.83 y posteriormente, el 27.III.88, se vieron dos ejemplares más. Registrada también en una aguada en Chancaní, Departamento Pocho, un ejemplar, el 3 y 4.V.86 y posteriormente el 8.V.86 en el Río de Chancaní, se observaron otros dos ejemplares. Registrada además en un juncal de la laguna Santo Domingo, Departamento Colón, donde había dos ejemplares el 14.VI.90. Por último, observada en un juncal en la localidad de La Laguna, un ejemplar, el 25.V.85.

25.- *Volatinia jacarina jacarina* (LINNE, 1766)

Es una especie que frecuenta, pastizales, arbustales y bordes de monte del norte y el este cordobeses. Ha sido citada pocas veces para la Provincia de Córdoba por NORES et al. (1983) y por SALVADOR (1983). Las nuevas citas son: Altos de Chipión, Departamento San Justo, el 28.XI.86, tres ejemplares. En los alrededores de Brinkmann, Departamento San Justo fue vista reiteradamente: en el mes II.85, un ejemplar; en el mes XII.85 se vieron otros, ocho ejemplares (cuatro machos y cuatro hembras.); en el mes I.86, 14 ejemplares. (ocho machos y seis hembras.); en el mes II.86, cuatro ejemplares; en el mes III.86, 20 ejemplares (quince machos y cinco hembras). El XI.87, 16 ejemplares (doce machos. y cuatro hembras.); en el mes II.88, cuatro ejemplares (dos machos y dos hembras.). En los alrededores de Morteros, Departamento San Justo, del 2 al 5.II.88, se vieron tres ejemplares. En Monte Maíz, Departamento Unión, el 26.XII.92, dos ejemplares. En Puesto de Castro, Departamento Río Seco, el 14.X.88, se vió un ejemplar. En Las Toscas, Departamento Ischilín, el 5.II.87, un ejemplar. En Guanaco Muerto, Departamento Cruz del Eje, el mes IV.81, se observó un ejemplar.

26.- *Poospiza hypochondria affinis* (BERLEPSCH, 1906)

Especie observada en el noroeste y oeste provincial, en otoño e invierno, en ambientes periserranos áridos con vegetación arbustiva y en las Sierras Grandes entre los 1800 y 2000 metros de altitud. La especie fue citada por NORES e YZURIETA (1986) en las cercanías de Copina y observada en algunas oportunidades en Sierra Grande por BALDO y ORDANO (1993).

Vista en Chancaní, Departamento Pocho, el 20.V.92, donde se observaron cinco ejemplares. Vista también en Las Toscas, Departamento Ischilín, el 4 y 5.VIII.89, un ejemplar; junto a otras especies de *Poospiza* y a *Zonotrichia capensis*. Vista en Sierra Grande, Departamento San Alberto, el 10 y 17.VII.89, seis grupos de entre 8 y 15 ejemplares, junto a *Phrygilus unicolor*, *Catamenia analis*, y *Zonotrichia capensis australis*. La especie fue observada en pastizales y roquedales de estas pampas de altura, donde eventualmente volaban individuos para posarse en un bosquecillo de sauces (*Salix alba*).

27.- *Sturnella loyca loyca* (MOLINA, 1782)

Esta especie fue observada en estepas secas y orillas de salinas del norte y del oeste provincial. NORES et al. (1983) la citan para el sur de Córdoba hasta los 33° de latitud sur. Fue observada en Los Pozos, Departamento Tulumba, el 25.VII.91, un ejemplar. En las proximidades de Ischilín, el 11.IV.92, dos ejemplares. En Las Toscas, Departamento Ischilín, el 9.V.87, un ejemplar y el 4 y 5.VIII.89, otros dos ejemplares. En Balde de la Orilla, Departamento Pocho, el 22.V.92, se registraron dos ejemplares. En la localidad de Las Jarillas, Departamento Pocho, los días 28 y 29.VII.88, se vieron otros dos ejemplares.

AGRADECIMIENTOS:

A Julio R. CONTRERAS y a Alejandro R. GIRAUDO por su colaboración en la elaboración de este trabajo, y por su lectura crítica del mismo.

BIBLIOGRAFIA:

- BALDO, J. y M. ORDANO. 1993. Nuevos registros de Aves para Sierra Grande, Departamento San Alberto, Santa María y Punilla, Provincia de Córdoba, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* (48): 1-5.
- CABRERA, A. 1976. Regiones Fitogeográficas Argentinas. Pp. 1-86, en: L. R. PARODI (Ed.) *Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería*, Tomo II, Editorial Acme, Buenos Aires.
- CONTRERAS, J. R. 1979. Avifauna Puntana. Algunas especies nuevas o poco conocidas para la Provincia de San Luis. *Hist. Nat.*, I (3): 9-12.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1971. *A Guide to the Birds of South America*. Oliver & Boyd. Edinburgh, pp. i-XIV + 1-470.
- NORES, M. y S. SALVADOR. 1985. Nuevos Registros de Aves para La Rioja, Argentina. *Hist. Nat.*, 5 (24): 207-208.
- NORES, M. y D. YZURIETA. 1986. Nuevas Localidades para Aves Argentinas. VII. *Hist. Nat.*, 6 (10): 49-52.
- NORES, M.; D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y Distribución de las Aves de Córdoba, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba*, 56 (1-2): 1-114.

- MIATELLO, R.; V. COBOS y C. ROSACHER. 1991. Algunas Especies de Aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba, República Argentina. *Hist. Nat.*, 8(1): 1-5.
- LUTI, R. M. BELTRAN; F. GALERA; N. MULLER; M. BERZAL; M. NORES; M. HERRERA y J. BARRERA. 1979. Vegetación. Pp. 297-367, en VAZQUEZ, J.; R. MIATELLO y M. ROQUE (Eds.): *En Geografía Física de la Provincia de Córdoba*. Editorial Boldt, Córdoba
- SALVADOR, S. 1983. *La Avifauna de Villa María y sus alrededores*. Escuela Víctor Mercante, Villa María, Córdoba, Argentina, pp. 1-26.
- OLROG, Claes. 1959. *Las Aves Argentinas. Una Guía de Campo*. Inst. Miguel Lillo, Tucumán, pp. 1-343.
- OLROG, Claes. 1979. Nueva Lista de la Avifauna Argentina, *Opera Lill.*, 27: 1-324.

NOTULAS FAUNISTICAS

Boletín de Ciencias Naturales de aparición no periódica
Editor Responsable: Julio Rafael CONTRERAS
Casilla de Correo 26, 3400 Corrientes, ARGENTINA.