

# Notas de interés



## Censo Neotropical de Aves Acuáticas CNAA Febrero 2009 Algunos resultados obtenidos.

El CNAA correspondiente al mes de febrero finalizó el domingo 23 pasado. Los técnicos y voluntarios de Guyra Paraguay en sus recorridos por el Sur, Bajo Chaco y Chaco Central obtuvieron mejores resultados en comparación al año 2008.

En el Sur del país recorrieron siete IBAs y cuatro sitios de importancia para aves acuáticas.

El Sitio con más especies censadas fue Estancia La Graciela en el departamento Misiones, con un total de 26 especies y el sitio con la menor cantidad de especies fue Estero Kuruñai.

El sitio con mayor cantidad de individuos fue Estero Ñeembucú – Ruta IV Nueva (Ñeembucú) con un total de 3.693 individuos. Las especies con mayor cantidad de individuos en todo el recorrido fueron; cuervillo cara pelada *Phimosus infuscatus* con 1.862 individuos y el cuervillo de cañada *Plegadis chihi* con 2.803 individuos.

El recorrido por el Bajo Chaco y Chaco Central consistió en el recorrido de dos IBAs y cuatro sitios de importancia para las aves acuáticas. La IBA Lagunas Saladas – Riacho Yacaré (complejo de lagunas saladas en el departamento Presidente Hayes) permitió contar un total de 3.727 individuos, la especie con mayor cantidad en el sitio se trató del pitotoi chico *Tringa flavipes* llegando a 704 individuos, seguido del tero real *Himantopus melanurus* con 623 individuos en toda la cuenca Yacaré Sur, también un total de 89 flamencos *Phoenicopterus chilensis* y 187 individuos de la cigüeña americana *Ciconia maguari*.

Otras observaciones importantes fueron grandes cantidades de patos; en Salazar se estimó 550 patos silbones de ala blanca *Dendrocygna autumnalis* y 11 individuos de patos gansos *Sarkidiornis melanotos*

donde en algunos meses atrás se llegó a censar 250 individuos de esta especies.

En la Ruta 9 – Bajo Chaco se observaron 718 individuos de *Bubulcus ibis* y en la Cuenca Río Verde unos 80 individuos, todos con su plumaje nupcial. Estos datos son nada más algunos de los resultados obtenidos en las campañas de Guyra para esta temporada.

La Bahía de Asunción también fue visitada y se llegó a contar un total de 572 individuos de 21 especies de aves acuáticas. La especie más numerosa con 188 individuos fue la garza blanca *Ardea alba*. Una especie no muy común en la Bahía y que fue registrado con solo un individuo, fue el pato bragado *Cairina moschata*.

Por Silvia Centrón

Fotografía: *Sarkidionis melanotos*. Silvia Centrón

