

# *Tryngites subruficollis*

## Playerito canela

Especie del mes



Foto: Arne J. Lesterhuis

### ***Tryngites subruficollis* (Vieillot, 1819)**

Estado de conservación a nivel global: Casi Amenazado (NT). El playerito canela es una de las 32 especies de aves que migra del norte del continente americano hacia el sur, llegando al Paraguay desde el mes de agosto, haciendo movimientos de “pasada” aproximadamente hasta el mes de abril.

El playerito canela pertenece al orden *Charadriiformes*, familia *Scolopacidae*, y es una de las especies de la familia que se la puede identificar rápidamente; sin embargo, es necesario tener un poco de conocimiento sobre este grupo de playeros para poder tener una identificación rápida de la especie.

Su morfología permite que la especie se pueda diferenciar de las demás aves playeras; mide 17 cm, su pico es corto, su plumaje es ocráceo acanelado con el dorso “manchado” de negro, con un periocular blancuzco y patas amarillentas. Generalmente se lo observa en playas de lagunas, bancos de arena y pastizales cortos.

Se reproducen al norte de Norteamérica (costas árticas de Alaska y Canadá, existiendo poblaciones reproductoras aisladas y relicticas en Rusia) y pasan su invernada al Sureste de Sudamérica. Durante su migración postnupcial cruza toda América del Norte y Centro América para llegar a las costas del norte de Suramérica, desde donde se dirige a sus cuarteles de invernada (en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia) atravesando el continente, en una ruta que cruza la parte central de la Amazonía y el Pantanal. La migración hacia el norte sigue la misma ruta (comenzando ésta en febrero, aunque las hembras pueden salir incluso en marzo), pero forman un frente más

amplio, atravesando Brasil, Venezuela, Guyana y Surinam, cruzan Centro América, para finalmente llegar a las costas de Norte América cruzando el Golfo de México (Textualmente de *BirdLife International* 2006).


En Paraguay, la especie se distribuye bordeando las playas del río Paraguay de norte a sur, también en zonas de humedales del Chaco y Pantanal. El sitio con mayor cantidad de individuos registrados en Paraguay es la Bahía de Asunción, se censó más del 3% de la población mundial de la especie y ésto calificó al sitio como Área Importante para la Conservación de las Aves – IBA.





Foto: Leticia López

### Mapa de distribución



#### *Scolopacidae*

*Tryngites subruficollis* (Buff-breasted sand piper)  
Chululu'i

Este año el conteo más alto de individuos de la especie fue de 120 individuos en la Bahía de Asunción, Playa del Sol.

Por Silvia Centrón